

## التغيرات الفصلية في تركيز نتروجين يوريا الحليب بالعلاقة مع موسم ومرحلة الحلبة وإنتاج الحليب اليومي ومكوناته من الدسم والبروتين لدى أبقار الفريزيان

\*أ.د. العزيز محي و \*\*أ.د. خالية رياض و \*\*العريفي ياسين أحمد

\* قسم الإنتاج الحيواني - كلية الزراعة - جامعة حلب، \*\* قسم الإنتاج الحيواني - كلية الزراعة - جامعة الفرات

### الملخص

تم تنفيذ هذا البحث في مبقرة ديرالزور التابعة للمؤسسة العامة للمبادر في الفترة من كانون الثاني حتى كانون الأول 2010م. أجريت هذه الدراسة بهدف تقدير التغيرات الفصلية في تركيز نتروجين يوريا الحليب بالعلاقة مع موسم ومرحلة الحلبة وإنتاج الحليب اليومي ومكوناته من الدسم والبروتين لدى أبقار الفريزيان. استخدم في هذه التجربة ( 40 ) بقرة حلوبي من سلالة الفريزيان تتبع لمواسم حلبة مختلفة، من بعد الولادة بشهر ولغاية الشهر السادس للحلبة. تم تقسيم حيوانات التجربة إلى مجموعتين حسب فصل الولادة: المجموعة الأولى (الولادة في فصل الشتاء) وتضم (20) بقرة (10 موسم أول - 10 موسم ثالث). المجموعة الثانية (الولادة في فصل الصيف) وتضم (20) بقرة (10 موسم أول - 10 موسم ثالث). بينت نتائج البحث أن المتوسط الكلي لتركيز نتروجين يوريا الحليب كان أعلى بشكل معنوي في المجموعة الثانية 18.70 ملغم/دل عنده في المجموعة الأولى 18.61 ملغم/دل. متوسطات تركيز نتروجين يوريا لدى أبقار الموسم الأول (18.61 ملغم/دل) كانت أعلى بشكل معنوي عنها في أبقار الموسم الثالث (18.09 ملغم/دل). كان لمرحلة الحلبة تأثير معنوي في تركيز نتروجين يوريا الحليب في كلا المجموعتين. كما دلت عاملات الارتباط المظهرية على وجود علاقة ايجابية معنوية بين تركيز نتروجين يوريا الحليب وكل من الإنتاج اليومي للحليب ونسبة البروتين. في حين كانت العلاقة سلبية معنوية مع نسبة دسم الحليب. لذلك عند إجراء اختبار تقدير نتروجين يوريا الحليب كأداة لتحديد فعالية استخدام نتروجيني للغذاء يجب الأخذ بعين الاعتبار العلاقة القائمة بينه وبين كل من موسم ومرحلة الحلبة وإنتاج الحليب اليومي ومكوناته من الدسم والبروتين.

**الكلمات المفتاحية:** نتروجين يوريا في الحليب - إنتاج الحليب و مكوناته - موسم الحلبة - مرحلة الحلبة - أبقار الفريزيان.

## 1- المقدمة:

لقي اختبار قيمة نتروجين البورياء في الحليب (MUN) انتشاراً واسعاً لدى مراكز تطوير مائشية اللقين (DHI) في شمال أمريكا نهاية هذا العقد من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بتعذر قطعان التربية (Arunvipas et al. 2004). ولقد سبق هذا الأمر دراسات بينت ذلك وأكّدت إمكانية استخدامه كدليل دافع لكتفافة الاستفادة من البروتين لدى أبقار الحليب للحصول على أكبر فائدة من البروتين المستخدم يمكن أن يكون مؤشر قيم من أجل معرفة تغذية وصحة الأبقار. ويعتبر (Kohn 2007) أن مستوى نتروجين البورياء في الحليب MUN مؤشر للتغذية المناسبة ولكفاءة استخدام النتروجين لدى أبقار الحليب كما يعتبره أدلة جيدة لتغيير النتروجين المطروح خارج الجسم وبالتالي التقليل من التلوث البيئي.

خلال السنين الماضية قام العلماء بالعديد من الابحاث لدراسة العلاقة بين نتروجين بوريا الحليب والكتفافة الإنتاجية لدى أبقار الحليب ولقد كان هناك تباين في نتائج الدراسات. وعلى سبيل المثال تم التوصل من قبل العديد من الباحثين لوجود علاقة ارتباط ايجابية بين نتروجين بوريا الحليب وكمية إنتاج الحليب (Carlsson et al., 1995; Godden et al., 2001; Johnson and Young, 2003) بينما كانت علاقة الارتباط سلبية حسب نتائج (Ismail et al. 1996) في حين لم يجد آخرون ارتباط بين مستوى نتروجين البورياء وكمية إنتاج الحليب (Carroll et al., 1988; Baker et al., 1995; Johnson and Young 1995; Baker et al., 2001). من ناحية أخرى (Godden et al., 2001; Rodriguez et al., 2001; Johnson and Young, 2003; Cao et al., 2010) وجدوا علاقة ارتباط ايجابية بين نتروجين بوريا الحليب ونسبة بروتين الحليب. بينما وجد (Broderick and Clayton; 1997; Godden et al., 2001; Hof et al. 1997) أن محتوى الحليب من النتروجين يتأثر بفضل السنة والتغذية وموسم الحالة (العمر) وكمية إنتاج الحليب والحالة الفيزيولوجية للحيوان.

2- الهدف من البحث : إن دراسة العوامل المؤثرة على مستوى نتروجين البورياء في حليب الأبقار يعتبر من المواضيع الهامة التي يجب إثارتها والتركيز عليها. ولذلك فقد جاء هذا البحث لتغيير التغيرات الفصلية في

**تبروجن بوريا الحليب** ينبع مع موسم ومرحلة الحلاوة وانتاج الحليب اليومي ومكوناته من النعم والبروتين لدى مصدر الفيريان.

3 - مواد وطرائق البحث:

تم تقييد هذا البحث في مقدمة ديرالزور التابعة للمدرسة العامة للمداقر وذلك في الفترة من كانون الثاني حتى كانون الأول 2010م.

### **١-٣- حيوانات النجربة وظروف رعايتها:**

أجريت هذه الدراسة على ( 40 ) يقرة حلوى من سلالة الفريزيان تتنبئ لمواسم حلبة مختلفة، من بعد الولادة بـ ٣٠ يوماً ولغاية الشهر السادس للحلبة. تم اختبار حيوانات التجربة بطريقة عشوائية حيث توزعت بين الموسم الأول والثالث. تتمتع جميع هذه الأبقار بحالة صحية جيدة ويتراوح متوسط أعمارها وأوزانها ما بين ( 2.2 - 4 سنة) و ( 400 - 550 كع). تم تقسيم حيوانات التجربة إلى مجموعتين حسب فصل الولادة: المجموعة الأولى (الولادة في فصل الشتاء) من ( 11 ولغاية 12/19 / 2009) ونضم (20) يقرة (10 موسم أول - 10 موسم ثالث)، المجموعة الثانية (الولادة في فصل الصيف) من ( 13 ولغاية 2010/6/21) ونضم (20) يقرة (10 موسم أول - 10 موسم ثالث). خضعت العينة المدروسة من الأبقار لظروف الرعاية المتبعة من حيث التغذية والإبراء واللقاحات دون إجراء أي تعديل في برنامج عمل المبقرة، حيث وصعت الأبقار في الحظائر وفق نظام التربية حر صليق (مع وجود مساح ومضلات مائية) بناء على مستوى انتاجها من الحليب وذلك تمهيل عملية التعليب. واستخدمت المواد العلفية الخضراء و المعلبة و المركزة وفق النسب التالية ( 25 : 25 : 50)، و قدمت مياه الشرب بمقدار كافية.

- 3-2 - الظروف المناخية:

قيمت درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية في نقاط معينة بحيث تمثل جو الحظيرة وذلك يتعليق ميزان رقمي على ارتفاع مترين عن أرض الحظيرة، وتم تسجيل القراءات مرتين بالليوم (صباحاً - مساء) ثم حسبت المتوسطات في كلا المجموعتين (الولادة في الشتاء والصيف).

تم حساب دليل العيـء الحراري من المعادلة التالية: Castaneda et al. (2004)

$$THI = (1.8^{\circ}T + 32) - (0.55 - 0.0055 \cdot RH) (1.8^{\circ}T - 26)$$

حيث : THI دليل العبر الحراري، T درجة الحرارة (°)، RH الرطوبة النسبية (%).

-3- عادات الحليب:

جُمِعَت عيناتِ الحليب من أبقار التجربة في يوم كونتِرول تم تحديده بعد الولادة بـ شهر ولغاية الشهر السادس من الحلاوة. واستُخدمت العينات في تقدير محتوى الحليب من الدسم والبروتين كما تم جمع عينات الحليب في الحظيرة لتقدير تركيز تتروجين بوريا الحليب. وقد اقتصرت عينات الحليب المدرستة على الحلاوة الصباحية فقط.

٣-١-٣-٣- تقدر كمية الإنتاج اليومي للحليب ومكوناته من المواد الصلبة:

حسبت كمية الإنتاج اليومي للحليب في موعد كونتربول ثم تحديده كل 30 يوم اعتباراً من نهاية الشهر الأول للولادة وذلك في الأيام (30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180) حيث تمت حلاية الأبقار في المحلب الآلي في المفقرة. كما تمأخذ عينات حليب بمعدل (50مل) في الساعة الخامسة صباحاً و استخدمت هذه العينات لتقدير محتوى الحليب من المواد الصلبة ( الدسم - البروتين). قدرت نسبة الدسم والبروتين في عينات الحليب المدروسة بواسطة جهاز LACTOSCANSA بلغاري الصنع .

### 3-3-2- تقدير تركيز نتروجين البوريا في الحليب:

جُمعت عينات الحليب من أبقار التجربة داخل المطعيرة في الصباح من الساعة 9 لغاية 10:45 بمعدل (50) وزن في الأئم (30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180) بعد الولادة، واستخدمت هذه العينات في تقدير تركيز نتروجين البوريا (MUN). جرى نقل عينات الحليب للحصول على المصل وذلك باستخدام جهاز ضرر مركزي مدة (20) دقيقة بسرعة (3000 دوره/دقيقة)، ثم سحب المصل ووضع في أنبوب بلاستيكية (Eppendorf) سعة (5.5 ml)، وحفظت في المجمدة على حرارة (-20°C) لحين التحليل.

تم تقدير نتروجين البوريا في مصل الحليب باستخدام جهاز كيميائي يصنف إلى يعتمد مبدأ الطيف الضوئي (Spectrophotometer) إيطالي الصنع موديل (Evolution 3000) يعمل على تقدير البوريا بطريقة لوبيا: تتم القراءة حسب اللون حيث يشكل لون بنتهاية التفاعل (نقطة النهاية) ثم يقوم الجهاز بشكل آلي بقراءة الامتصاصية × العامل (Factor). بعد تقدير البوريا تم حساب نتروجين البوريا في الحليب وفق المعادلة التالية التي ذكرها (Butler et al. 1996):  $MUN(\text{mg/dl}) = MU(\text{g/l}) \times 47$  حيث أن النتروجين يشكل 47% من الوزن الجزيئي للبوريا.

### 3-4- التحليل الإحصائي:

تم تدوين النتائج على برنامج Excel ومعالجتها باستخدام برنامج (SAS 2002)، وفق النموذج الخطي العام General Liner Procedure of SAS (GLM) وتم الفصل بين المتوسطات للعوامل المدروسة بطريقة داتلن، تم استخدام الموديل الرياضي التالي:

$$Y_{ijk} = \mu + D_i + P_j + S_k + (D \cdot P)_{ij} + (D \cdot S)_{ik} + (P \cdot S)_{jk} + (D \cdot P \cdot S)_{ijk} + e_{ijk}$$

حيث:  $Y_{ijk}$ : المؤشر المدروس -  $\mu$ : المتوسط العام -  $D_i$ : التأثير الثابت ل يوم الحلاوة ( 1 - 3 ) -  $P_j$ : التأثير الثابت لموسم الحلاوة ( 1 - 3 ) -  $S_k$ : التأثير الثابت لفصل السنة ( صيف - شتاء = k ) -  $e_{ijk}$ : الخطأ المتباين أو الخطأ العشوائي لكل مشاهدة في اليوم  $i$  في الموسم  $j$  في الفصل  $k$ .

## 4- النتائج والمناقشة:

## 1-4- تغيرات درجات الحرارة والرطوبة النسبية خلال فترة التجربة:

قيس درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية في نقاط معينة بحيث تمثل جو الحظيرة وتم حساب دليل العباء الحراري خلال فترة التجربة، و النتائج موضحة في الجدول (1).

جدول (1): المتوسطات مع الخطأ المعياري (Means $\pm$ SE) لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية ودليل العباء الحراري خلال فترة التجربة.

الفترة	شتاء	صيفاً	شتاء	صيفاً	شتاء	صيفاً	شتاء	صيفاً
بعد الولادة (بالليوم)	درجات الحرارة (°م)	درجات الحرارة (°م)	الرطوبة النسبية (%)	الرطوبة النسبية (%)	دليل العباء الحراري (THI)	دليل العباء الحراري (THI)	صيفاً	شتاء
30	15 $\pm$ 0.13	35 $\pm$ 0.27	65 $\pm$ 1.26	49 $\pm$ 1.35	58.74 $\pm$ 0.19	84.59 $\pm$ 0.40	دليل العباء الحراري (THI)	شتاء
60	17 $\pm$ 0.21	33 $\pm$ 0.25	63 $\pm$ 1.21	53 $\pm$ 1.35	61.55 $\pm$ 0.27	82.73 $\pm$ 0.37	دليل العباء الحراري (THI)	صيفاً
90	21.67 $\pm$ 0.56	26 $\pm$ 0.51	57 $\pm$ 2.67	57.5 $\pm$ 2.79	67.80 $\pm$ 0.65	73.98 $\pm$ 0.83	الرطوبة النسبية (%)	شتاء
120	24 $\pm$ 0.34	25 $\pm$ 0.29	54 $\pm$ 1.14	59 $\pm$ 1.31	70.68 $\pm$ 0.40	72.66 $\pm$ 0.39	الرطوبة النسبية (%)	صيفاً
150	30 $\pm$ 0.34	21 $\pm$ 0.37	52 $\pm$ 1.36	60 $\pm$ 1.35	78.55 $\pm$ 0.45	67.21 $\pm$ 0.56	دليل العباء الحراري (THI)	شتاء
180	33.5 $\pm$ 0.29	19 $\pm$ 0.28	51 $\pm$ 1.40	62 $\pm$ 1.27	83.03 $\pm$ 0.43	64.43 $\pm$ 0.40	دليل العباء الحراري (THI)	صيفاً
المتوسط الكلي	23.53 $\pm$ 0.39	26.50 $\pm$ 0.35	57 $\pm$ 0.32	56.75 $\pm$ 0.27	70.06 $\pm$ 0.52	74.27 $\pm$ 0.44	شتاء	صيفاً

المتوسطات التي تحمل أحرف مختلفة في النسق الواحد مختلفة معنويًا، ( $P<0.05$ ) وغير ذلك ( $P>0.05$ ). تراوح متوسط درجات الحرارة في المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء) بين ( $15^{\circ}\text{م}$  و  $33.5^{\circ}\text{م}$ ) بمتوسط كلي ( $23.5^{\circ}\text{م}$ ). وفي المجموعة الثالثة (الولادة في الصيف) كانت بين ( $19^{\circ}\text{م}$  و  $35^{\circ}\text{م}$ ) وبمتوسط كلي ( $26.5^{\circ}\text{م}$ ).

كما تراوحت متوسطات الرطوبة النسبية في المجموعة الأولى بين 51% و 65% بمتوسط كلي (%57). وفي المجموعة الثانية بين 49% و 62% بمتوسط كلي (%56.75).

تراوحت متوسطات قيم دليل العباء الحراري في المجموعة الأولى بين (58.74 و 83.03) بمتوسط كلي 70.06. وفي المجموعة الثانية بين (64.43 و 84.59) بمتوسط كلي 74.27. وكان متوسط دليل العباء الحراري في المجموعة الثانية أعلى عن المجموعة الأولى (حوالي 6.01 %). وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه (Bohmanova et al., 2007)

#### 4-2- تغير نتروجين البيريا في الحليب:

قدر تركيز نتروجين البيريا في الحليب (MUN) في نهاية الشهر الأول للولادة ولغاية الشهر السادس وذلك بالعلاقة مع فصل السنة وموسم الحلاوة ومرحلة الحلاوة. والنتائج مبينة في الجدول (2).

تراوح تركيز نتروجين البيريا في المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء) لدى أبقار الموسم الأول بين (16.89 و 20.12 ملخ/دل) بمتوسط كلي 18.28 ملخ/دل. وأبقار الموسم الثالث بين (16.33 و 19.69 ملخ/دل) بمتوسط كلي 17.73 ملخ/دل.

كما تراوح التركيز في المجموعة الثانية (الولادة في الصيف) لدى أبقار الموسم الأول بين (14.98 و 22.45 ملخ/دل) بمتوسط كلي 18.95 ملخ/دل. وأبقار الموسم الثالث بين (14.47 و 21.98 ملخ/دل) بمتوسط كلي 18.46 ملخ/دل.

هناك فروق معنوية ( $P < 0.05$ ) بين المجموعات حيث كانت القيم ملخصة في المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء) و مرتفعة في المجموعة الثانية (الولادة في الصيف). وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه كل من (Hojman et al., 2004; El-Shewy et al., 2010; Kamoun et al., 2012)

وحدثت فروق معنوية ( $P < 0.05$ ) بين أبقار الموسم الأول والثالث في كلا المجموعتين حيث كان تركيز نتروجين البيريا أقل (حوالي 3.01%) لدى أبقار الموسم الثالث بالمقارنة مع أبقار الموسم الأول في المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء). وكذلك في المجموعة الثانية (الولادة في الصيف) كانت الفروق معنوية ( $P < 0.05$ ) حيث كان التركيز أقل (حوالي 2.59%) لدى أبقار الموسم الثالث بالمقارنة مع أبقار الموسم الأول. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه كل من (Godden et al., 2001; Johnson and

(2010) الذين وجدوا ارتفاع تركيز نتروجين بوريا الحليب لدى أيقار الموسم الأول مقارنة مع أيقار الموسم الثالث.

جدول (2): المتوسطات مع الاتحراف المعياري (SD  $\pm$  Means) لنتروجين البوريا (MUN ملغم/دل) في حليب أيقار التفريزيان تبعاً لفصل السنة و موسم و مرحلة الحلاوة بعد الولادة.

الفترة بعد الولادة (بال أيام)	الولادة في فصل الصيف		الولادة في فصل الشتاء		المتوسط الكلي	
	أيقار موسم أول		أيقار موسم ثالث			
	G4	G3	G2	G1		
18.18 <sup>c</sup> $\pm$ 0.37	18.58 $\pm$ 0.20	19.13 $\pm$ 0.22	17.18 $\pm$ 0.20	17.82 $\pm$ 0.20	30	
21.06 <sup>a</sup> $\pm$ 0.33	21.98 $\pm$ 0.26	22.45 $\pm$ 0.27	19.69 $\pm$ 0.20	20.12 $\pm$ 0.26	60	
19.77 <sup>b</sup> $\pm$ 0.33	20.44 $\pm$ 0.19	20.86 $\pm$ 0.31	18.67 $\pm$ 0.22	19.13 $\pm$ 0.22	90	
18.64 <sup>c</sup> $\pm$ 0.37	19.04 $\pm$ 0.19	19.55 $\pm$ 0.27	17.69 $\pm$ 0.26	18.29 $\pm$ 0.20	120	
16.80 <sup>a</sup> $\pm$ 0.38	16.29 $\pm$ 0.26	16.71 $\pm$ 0.20	16.80 $\pm$ 0.38	17.41 $\pm$ 0.22	150	
15.67 <sup>b</sup> $\pm$ 0.40	14.47 $\pm$ 0.38	14.98 $\pm$ 0.35	16.33 $\pm$ 0.22	16.89 $\pm$ 0.20	180	
18.35 $\pm$ 2.00	18.46 <sup>b</sup> $\pm$ 2.53	18.95 <sup>a</sup> $\pm$ 2.52	17.73 <sup>c</sup> $\pm$ 1.18	18.28 <sup>b</sup> $\pm$ 1.11		

التي تحمل أحرف مختلفة في التسق انواحد مختلفة معنوية، ( $P<0.05$ ) وغير ذلك ( $P>0.05$ ).

هناك فروق معنوية ( $P<0.05$ ) بين متوسطات تركيز نتروجين البوريا في الحليب خلال مرحلة الحلاوة (موعد القراءة) في كلا المجموعتين حيث كانت مرتفعة في (90 يوم) الأشهر الثلاثة الأولى (18.18 - 21.06 - 19.77 ملغم/دل) ثم انخفضت من الشهرين الرابع والخامس (الشهرين السادس والسادس) (Tillard et al., 2007; Mouffok et al., 2011).

كانت قيم دليل درجات الحرارة والرطوبة النسبية (THI) في الأشهر الثلاثة الأولى لدى المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء) أكثر ملائمة (58.74 و 55.61 و 67.80) من مقابلتها في المجموعة الثانية

ما توصل إليه كل من (Hojman et al., 2004; El-Shewy et al., 2010; Kamoun et al., 2012). (73.98 و 82.73 و 84.59) مما يعكس إيجابياً في تركيز نتروجين بوريا الحليب. وهذه النتيجة تتفق مع

#### 4-3-4- تقدير كمية الإنتاج اليومي من الحليب:

حسب كمية الإنتاج اليومي للحليب في نهاية الشهر الأول للولادة ولغاية الشهر السادس وذلك بالعلاقة مع فصل السنة وموسم الحلاوة ومرحلة الحلاوة. تم توضيح النتائج في الجدول (3).

تراوحت كمية الحليب في المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء) لدى أبقار الموسم الأول بين (14 و 23 كغ)

جدول (3):المتوسطات مع الانحراف المعياري ( $SD \pm$  Means) لكمية الإنتاج اليومي من الحليب كغ) لأبقار الفريزيان تبعاً لفصل السنة وموسم و مرحلة الحلاوة بعد الولادة.

الفترة بعد الولادة (بالأيام)	الولادة في فصل الشتاء				المتوسط الكلي	
	الولادة في فصل الصيف		الولادة في فصل الشتاء			
	أبقار موسم أول	أبقار موسم ثالث	أبقار موسم أول	أبقار موسم ثالث		
G4	G3	G2	G1			
20.62 <sup>b</sup> ±1.96	21.00±2.26	19.10±0.99	22.00±2.00	20.40±1.65	30	
23.55 <sup>a</sup> ±2.24	24.00±2.36	22.10±1.20	25.10±2.33	23.00±2.11	60	
21.27 <sup>b</sup> ±2.11	21.45±2.34	19.55±1.07	23.00±2.26	21.10±1.73	90	
18.21 <sup>c</sup> ±1.69	18.70±1.34	16.90±0.74	19.65±1.97	17.60±1.43	120	
16.47 <sup>d</sup> ±1.49	16.60±1.35	15.60±0.70	17.90±1.85	15.80±1.03	150	
14.18 <sup>e</sup> ±1.21	14.30±0.98	13.70±1.01	14.75±1.55	14.00±1.23	180	
19.05±3.64	19.34 <sup>e</sup> ±3.70	17.82 <sup>d</sup> ±2.93	20.40 <sup>a</sup> ±3.94	18.65 <sup>b</sup> ±3.49		

المتوسطات التي تحمل أحرف مختلفة في النسق الواحد مختلفة معنوياً ( $P<0.05$ ) وغير ذلك ( $P>0.05$ ).

بمتوسط كلي 18.65 كغ . وأبقار الموسم الثالث بين (14.75 و 10.25 كغ) بمتوسط كلي 20.40 كغ.

كما تراوحت كمية الحليب في المجموعة الثانية (الولادة في الصيف) لدى أبقار الموسم الأول بين (13.70 و 10.10 كغ) بمتوسط كلي 17.82 كغ. وأبقار الموسم الثالث بين (14.30 و 14.24 كغ) بمتوسط كلي 19.34 كغ.

هناك فروق معنوية ( $P < 0.05$ ) بين المجموعات حيث كانت القيم مرتفعة في المجموعة الأولى ومنخفضة في المجموعة الثانية وهذه النتيجة تتفق مع ما وجده كل من (Flamenbaum et al., 1995; Bouraoui et al., 2002; Ahmed, 2009) كما وجدت فروق معنوية ( $P < 0.05$ ) بين أبقار الموسم الأول والثالث في كلا المجموعتين حيث كانت كمية الحليب لدى أبقار الموسم الأول أقل ( حوالي 8.58 % ) بالمقارنة مع أبقار الموسم الثالث في المجموعة الأولى . وكذلك في المجموعة الثانية كانت الفروق معنوية ( $P < 0.05$ ) حيث كانت كمية الحليب أقل ( حوالي 7.86 % ) لدى أبقار الموسم الأول بالمقارنة مع أبقار الموسم الثالث .

هناك فروق معنوية ( $P < 0.05$ ) بين متوسطات كميات الحليب اليومية خلال مرحلة الحلانية (موعد القراءة) في كلا المجموعتين حيث كانت مرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى ثم انخفضت حتى نهاية الشهر السادس (180 يوم). وبلغت أعلى قيمة لكمية الحليب ( حوالي 23.55 كغ ) بعد 60 يوم، في حين كانت أقل قيمة ( حوالي 14.18 كغ ) في اليوم 180 . وربما يرجع سبب لانخفاض كمية الحليب بعد الأشهر الثلاثة الأولى لعدم وجود توازن بين محتوى مواد العلف من الطاقة والبروتين .

كانت قيم دليل درجات الحرارة والرطوبة النسبية (THI) خلال الأشهر الثلاثة الأولى في المجموعة الأولى أعلى ملائمة ( 58.74 - 61.55 - 67.80 ) من مقابلتها في المجموعة الثانية ( 82.73 - 84.59 - 73.98 ) مما انعكس ايجابياً في كمية الحليب المنتجة . وهذه النتيجة تتفق مع نتائج كل من (Flamenbaum et al., 1995; Bouraoui et al., 2002; Ahmed, 2009).

## 4-4- تقيير محتوى الحليب من الدسم:

قدرت النسبة المئوية لدم الحليب في نهاية الشهر الأول للولادة ولغاية الشهر السادس وذلك بالعلاقة مع فصل السنة وموسم الحلاوة ومرحلة الحلاوة، و النتائج مبينة في الجدول (4).

تراوحت نسبة الدسم في المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء) لدى أبقار الموسم الأول بين (3.45% و 3.60%) بمتوسط كلي 3.51%. وأبقار الموسم الثالث بين (3.41% و 3.50%) بمتوسط كلي 3.45%.

كما تراوحت نسبة الدسم في المجموعة الثانية (الولادة في الصيف) لدى أبقار الموسم الأول بين (3.40% و 3.55%) بمتوسط كلي 3.46%. وأبقار الموسم الثالث بين (3.36% و 3.47%) بمتوسط كلي 3.42%.

جدول (4):المتوسطات مع الاحرف المعياري (%MF  $\pm$  Means) لنسبة الدسم (SD) في حليب أبقار الفريزيان تبعاً لفصل السنة و موسم و مرحلة الحلاوة بعد الولادة.

المتوسط الكلي	الولادة في فصل الصيف		الولادة في فصل الشتاء		الفترة بعد الولادة (بال أيام)
	أبقار موسم أول	أبقار موسم ثالث	أبقار موسم أول	أبقار موسم ثالث	
	G4	G3	G2	G1	
3.50 <sup>a</sup> $\pm$ 0.03	3.47 $\pm$ 0.01	3.49 $\pm$ 0.02	3.49 $\pm$ 0.02	3.56 $\pm$ 0.01	30
3.44 <sup>b</sup> $\pm$ 0.02	3.42 $\pm$ 0.01	3.45 $\pm$ 0.01	3.43 $\pm$ 0.02	3.47 $\pm$ 0.03	60
3.42 <sup>b</sup> $\pm$ 0.04	3.38 $\pm$ 0.02	3.41 $\pm$ 0.01	3.42 $\pm$ 0.02	3.47 $\pm$ 0.02	90
3.41 <sup>b</sup> $\pm$ 0.02	3.36 $\pm$ 0.01	3.40 $\pm$ 0.01	3.41 $\pm$ 0.02	3.45 $\pm$ 0.03	120
3.46 <sup>b</sup> $\pm$ 0.03	3.44 $\pm$ 0.02	3.45 $\pm$ 0.01	3.46 $\pm$ 0.01	3.50 $\pm$ 0.02	150
3.53 <sup>a</sup> $\pm$ 0.03	3.45 $\pm$ 0.02	3.55 $\pm$ 0.02	3.50 $\pm$ 0.01	3.60 $\pm$ 0.03	180
3.46 $\pm$ 0.05	3.42 <sup>b</sup> $\pm$ 0.03	3.46 <sup>b</sup> $\pm$ 0.05	3.45 <sup>b</sup> $\pm$ 0.04	3.51 <sup>a</sup> $\pm$ 0.06	المتوسط الكلي

المتوسطات التي تحمل أحرف مختلفة في النسق الواحد مختلفة معنوياً، ( $P>0.05$ ) و غير ذلك ( $P<0.05$ ).

هناك فروق معنوية ( $P<0.05$ ) بين المجموعات حيث كانت القيم مرتفعة لدى أبقار الموسم الأول في المجموعة الأولى ومنخفضة لدى أبقار الموسم الأول والثالث في المجموعة الثانية . وبพiggs من هذه النتائج ارتفاع نسبة الدسم في فصل الشتاء مقارنة مع فصل الصيف وهذه النتيجة تؤكّد ما توصل إليه كل من (Bouraoui et al. 2002; Lujerdean et al., 2008; Ahmed, 2009).

ويزى (Habeeb et al. 1991) أن سبب انخفاض نسبة دسم الحليب في فصل الصيف ربما يرجع لانخفاض كمية المواد الغذائية المتناولة وبالتالي انخفاض إنتاج الحليب وتكوين الشحوم الثلاثية من الجليسيرول والأحماض الدهنية المتاحة. وكذلك (Knapp and Grummer 1991) ذكر أن سبب الانخفاض في نسبة دسم الحليب ربما يكون قلة محتوى الغذاء من الألياف مما يؤثر على عمليات التخمر داخل الكريث.

ووجدت أيضاً فروق معنوية ( $P<0.05$ ) بين أبقار الموسم الأول والثالث في المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء) حيث كانت نسبة الدسم أعلى (حوالي 1.74 %) لدى أبقار الموسم الأول بالمقارنة مع أبقار الموسم الثالث. أما في المجموعة الثانية (الولادة في الصيف) لم يكن هناك فروق معنوية ولكن كانت نسبة الدسم أقل ( حوالي 1.16%) لدى أبقار الموسم الثالث بالمقارنة مع أبقار الموسم الأول.

هناك فروق معنوية ( $P<0.05$ ) بين متوسطات نسبة الدسم خلال مرحلة الحلبة (موعد القراءة) في كلا المجموعتين حيث كانت مرتفعة في الشهر الأول (3.50%) و انخفضت تدريجياً لغاية الشهر الرابع (3.41%). ثم ارتفعت في الشهر الخامس (150 يوم) وبلغت أعلى نسبة (3.53%) في الشهر السادس (180 يوم). ولقد وجد أن المتوسط الكلي لقيم درجات الحرارة والرطوبة النسبية (THI) في المجموعة الأولى أكثر ملائمة (67.67) عنه في المجموعة الثانية (75.65) مما يمكن ايجابياً في نسبة الدسم. وهذا يتفق مع نتائج ( Bouraoui et al., 2002; Ahmed, 2009)

#### 4-5- تقييم محتوى الحليب من البروتين:

قدرَت نسبة المئوية لبروتين الحليب في نهاية الشهر الأول للولادة ولغاية الشهر السادس وذلك بالعلاقة مع فصل السنة وموسم الحلبة ومرحلة الحلبة. ونتائج مبينة في الجدول (5).

ترأواحت نسبة البروتين في المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء) لدى أبقار الموسم الأول بين (3.41 و 3.55 %) بمتوسط كلي 3.48 %. وأبقار الموسم الثالث بين (3.37 و 3.49 %) بمتوسط كلي .3.44

كما تراواحت نسبة البروتين في المجموعة الثانية (الولادة في الصيف) لدى أبقار الموسم الأول بين (3.38 و 3.49 %) بمتوسط كلي 3.44 %. وأبقار الموسم الثالث بين (3.35 و 3.44 %) بمتوسط كلي .3.40. وحسب دراسات Bernabucci and Calamari (1998) فإن انخفاض تخلق بروتين الحليب ربما يعود لانخفاض كمية البروتين في العلبة أو انخفاض عدد البكتيريا داخل الكرش أو انخفاض محتوى العلبة من الطاقة.

جدول (5): المتوسطات مع الانحراف المعياري ( $SD \pm \text{Means}$ ) لنسبة البروتين (%) MP في حليب أبقار الفريزيان تبعاً لفصل السنة وموسم و مرحلة الحلاوة بعد الولادة.

المتوسط الكلى	الولادة في فصل الصيف		الولادة في فصل الشتاء		الفترة بعد الولادة (بال أيام)
	أبقار موسم أول	أبقار موسم ثالث	أبقار موسم أول	أبقار موسم ثالث	
	G4	G3	G2	G1	
3.45 <sup>a</sup> ±0.03	3.42±0.01	3.46±0.02	3.43±0.01	3.48±0.02	30
3.48 <sup>a</sup> ±0.04	3.43±0.02	3.47±0.02	3.49±0.02	3.55±0.02	60
3.47 <sup>a</sup> ±0.03	3.44±0.02	3.49±0.01	3.45±0.01	3.50±0.01	90
3.46 <sup>a</sup> ±0.03	3.41±0.01	3.44±0.03	3.47±0.01	3.52±0.01	120
3.40 <sup>b</sup> ±0.03	3.37±0.03	3.41±0.03	3.40±0.02	3.43±0.01	150
3.38 <sup>b</sup> ±0.03	3.35±0.03	3.38±0.03	3.37±0.01	3.41±0.03	180
3.44±0.05	3.40 <sup>c</sup> ±0.04	3.44 <sup>b</sup> ±0.04	3.44 <sup>b</sup> ±0.04	3.48 <sup>a</sup> ±0.05	المتوسط الكلى

المتوسطات التي تحمل أحرف مختلفة في النسق الواحد مختلفة معنوياً ( $P<0.05$ ) وغير ذلك ( $P>0.05$ ).

ووجدت فروق معنوية ( $P<0.05$ ) بين أبقار الموسم الأول والثالث في كلا المجموعتين حيث كانت نسبة البروتين أعلى (حوالي 1.16%) لدى أبقار الموسم الأول بالمقارنة مع أبقار الموسم الثالث في المجموعة الأولى (الولادة في الشتاء). وكذلك في المجموعة الثانية (الولادة في الصيف) كانت الفروق معنوية ( $P<0.05$ ) حيث كانت نسبة البروتين أعلى (حوالي 1.16%) لدى أبقار الموسم الأول بالمقارنة مع أبقار الموسم الثالث.

هناك فروق معنوية ( $P<0.05$ ) بين متوسطات نسبة البروتين خلال مرحلة الحلبة (موعد القراءة) في كلا المجموعتين حيث كانت مرتفعة في الأشهر الأربع الأولى (3.45 - 3.47 - 3.48 - 3.46% على التوالي) ثم انخفضت تدريجياً في الشهر الخامس والسادس (3.38 - 3.40% على التوالي).

كانت قيم دليل درجات الحرارة والرطوبة النسبية (THI) في الأشهر الأربع الأولى لدى المجموعة الأولى أكثر ملائمة (58.74 - 61.55 - 67.80 - 70.68 على التوالي) من مقابلاتها في المجموعة الثانية (84.59 - 82.73 - 73.98 - 72.66 على التوالي) مما انعكس إيجابياً على نسبة البروتين. وهذه النتيجة تؤكد ما توصل إليه (Bouraoui et al., 2002).

#### 4-6- الارتباطات المظهرية بين كمية الحليب ومكوناته من الدسم والبروتين ونتروجين البوريا في الحليب:

أظهرت معلمات الارتباط لكمية الحليب ومكوناته ونتروجين بوريا الحليب فيما سالبة ومحبطة خلال فترة التجربة. والنتائج موضحة في الجدول (6).

يرتبط الإنتاج اليومي للحليب بشكل قوي مع مستوى نتروجين البوريا في الحليب (0.67)، وبشكل جيد مع نسبة البروتين (0.55). كما يرتبط بشكل سلبي متوسط مع نسبة الدسم (-0.35).

يرتبط تركيز نتروجين البوريا في الحليب بشكل جيد مع نسبة البروتين (0.57)، وبشكل سلبي متوسط مع نسبة دسم الحليب (-0.42). وتنقذ هذه النتيجة مع ما تم التوصل إليه من قبل العديد من الباحثين فحسب. نتائج Cao et al. (2010) هناك علاقة ارتباط ايجابية بين مستوى MUN وبين كمية إنتاج الحليب ( $r=0.95$ ). ايضاً Nozad et al. (2011) فإن هناك علاقة ارتباط ايجابية بين تركيز MUN ونسبة البروتين ( $r=0.35$ ). وكذلك El-Shewy et al. (2010) وجدوا أن نسبة بروتين الحليب ترتبط بشكل ايجابي مع تركيز MUN.

و حسب نتائج (Hojman et al. 2004) فإن هناك علاقة سلبية بين تركيز نتروجين بوريا الحليب و نسبة الدسم و علاقة ايجابية مع نسبة البروتين. وكذلك (Cao et al. 2010) وجدوا أن هناك علاقة ارتباط سلبية بين (r=-0.98) ونسبة دسم الحليب (MUN).

جدول (6): معاملات الارتباط المظهرية للصفات المدروسة لأبقار الفريزيان خلال فترة التجربة

MP	MF	MUN	كمية الحليب kg(DMY)	الصفة
			0.67*	نتروجين بوريا في الحليب (MUN)
			-0.42*	دسم الحليب %(MF)
-0.13**	0.57*	0.55*		بروتين الحليب %(MP)

\* (P<0.05) : وغير ذلك (P>0.05).

5- الاستنتاجات والتوصيات: 1- المتوسط الكلى لتركيز نتروجين بوريا الحليب كان أعلى بشكل ملحوظ في المجموعة الثانية 18.70 ملخ/دل عن المجموعة الأولى 18 ملخ/دل. كما كانت متوسطات تركيز نتروجين بوريا الحليب لدى أبقار الموسم الأول (18.61 ملخ/دل) أعلى بشكل معنوي عنها في أبقار الموسم الثالث (18.09 ملخ/دل). 2- كان لمرحلة الحلبة تأثير معنوي في تركيز نتروجين بوريا الحليب في كلا المجموعتين حيث أن متوسطات تركيز نتروجين بوريا في الحليب كانت مرتفعة في الأشهر الأولى للحلبة ثم انخفضت تدريجياً حتى الشهر السادس. 3- دلت معاملات الارتباط المظهرية على وجود علاقة ايجابية معنوية بين تركيز نتروجين بوريا الحليب وكل من الإنماض اليومي للحليب ونسبة بروتين الحليب. في حين كانت العلاقة سلبية معنوية مع نسبة دسم الحليب. 4- عند إجراء اختبار تغير نتروجين بوريا الحليب

كاداً لتحديد فعالية استخدام نتروجين الغذاء لدى أبقار الفريزيان يجب الأخذ بعين الاعتبار العلاقة القائمة بينه وبين كل من موسم ومرحلة الحالية وإنتاج الحليب اليومي ومكوناته من النسـم والبروتين.

#### REFERENCES

- AHMED, M.M., 2009- **Alleviation of heat stress for promoting physiological and productive performance of Friesian cattle.** *Ph.D. Thesis, Faculty of Agriculture, Cairo University, Egypt.*
- ARUNVIPAS, P.; VAN LEEUWEN, J.A.; DOHOO, I.R. and KEEFE, G.P., 2004- **Bulk tank milk urea nitrogen: Seasonal patterns and relationship to individual cow milk urea nitrogen values.** *The Canadian Journal of Veterinary Research.* (68), 169-174.
- BAKER, L.D.; FERGUSON, J.D. and CHALUPA, W., 1995- **Response in urea and true protein of milk to different protein feeding schemes for dairy cows.** *Journal of Dairy Sciences,* (78), 2424-2434.
- BERNABUCCI, U. and CALAMARI, L., 1998- **Effects of heat stress on bovine milk yield and composition.** *Zoology and Animal Nutrition.* (24), 247-257.
- BOHMANOVA, J.; MISZTAL, I. and COLE, J. B., 2007- **Temperature-humidity indices as indicators of milk production losses due to heat stress.** *Journal of Dairy Sciences,* (90), 1947-1956.
- BOURAOUI, R.; LAHMAR, M.; MAJDOUB, A.; DJEMALI, M. and BELYEA, R., 2002- **The relationship of temperature-humidity index with milk production of dairy cow in a Mediterranean climate.** *Animal Research,* (51)479-491.
- BRODERICK, G. A., and CLAYTON M.K., 1997- **A statistical evaluation of animal and nutritional factors influencing concentrations of milk urea nitrogen.** *Journal of Dairy Sciences,* (80), 2964-2971.
- BUTLER, W. R.; CALAMAN, J.J. and BEAM, S. W., 1996- **Plasma and milk urea nitrogen in relation to pregnancy rate in lactation dairy cattle.** *Journal of Animal Science,* (74), 858-865.

CAO, Z.; HUANG, W.; WANG, T.; WANG, Y.; WEN, W.; MA, M. and LI, S., 2010- Effects of parity, days in milk production and milk components on milk urea nitrogen in Chinese Holstein. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, (4) 9: 688-695.

CARLSSON, J.; BERGSTROM, J. and PEHRSON, B., 1995- Variations with breed, age, season, yield, stage of lactation and herd in the concentration of urea in bulk milk and individual cow's milk. *Acta Veterinary Scand*, (36), 245-254.

CARROLL, D. J.; BARTON, A.; ANDERSON, G. W. and SMITH, R. D., 1988- Influence of protein intake and feeding strategy on reproductive performance of dairy cows. *Journal of Animal Science*, (71), 3470-3481.

CASTANEDA, C.A.; GAUGHAN, J.B. and SAKAGUCHI, Y., 2004- Relationships between climatic conditions and the behavior of feedlot cattle. *Animal Production in Australia*, (25), 33-36.

EL-SHEWY, A; KHALIF, S. and MORSY, T., 2010- Determination of milk urea nitrogen for the Egyptian cattle fed the summer and winter diets. *Journal of American Science*, (12) 6, 382-384.

FLAMENBAUM, I.; WOLFANSON, D.; KUNZ, P.L.; MAMEN, M. and BERMAN, A., 1995- Interactions between body condition at calving and cooling of dairy cows during lactation in summer. *Journal of Dairy Science*, (78), 2221-2229.

GODDEN, S.M.; LISSEMORE, K.D.; KELTON, D.F.; LESLIE, K.E.; WALTON, J.S. and LUMSDEN, J.H., 2001- Relationships between milk urea concentrations and nutritional management, production, and economic variables in Ontario dairy herds. *Journal of Dairy Science*, (84), 1128-1139.

HABEEB, A.A.; IBRAHIM, M.K. and HIEKAL, A.H., 1991- Environmental heat exposure effect on biosynthesis of milk components and some hormones in Friesian cows. *Egyptian Journal of Animal Production*, (19), 131-144.

- HOF, G.; VERVOORN, M. D.; LENAERS, P. J. and TAMMINGA, S., 1997- Milk urea nitrogen as a tool to monitor the protein nutrition of dairy cows. *Journal of Dairy Sciences*, (80), 3333-3340.
- HOJMAN, D.; KROLL, O.; ADIN, G.; GIPS, M.; HANOCHI, B. and EZRA, E., 2004- Relationships between milk urea and production , nutrition, and fertility traits in Israeli dairy herds. *Journal of Dairy Science*, (87), 1001- 1011.
- ISMAIL, A.; DIAB, K. and HILLERS, J.K., 1996- Effect of selection for milk yield and dietary energy on yield traits, bovine somatotropin and plasma urea nitrogen in dairy cows. *Journal of Dairy Science*, (79), 682-688.
- JOHNSON, R.G. and YOUNG, A.J., 2003- The association between milk urea nitrogen and DHI production variables in western commercial dairy herds. *Journal of Dairy Science*, (86), 3008-3015.
- KAMOUN, M.; JEMMALI, B.; SELMI, H.; TAYECHI, L.; BADREDDINE, M. and DRIDI, J., 2012- Monitoring milk urea level and feed ration as a potential tool for milk quality. *Journal of Physiology and Pharmacology Advances*, (1) 2, 69-76.
- KNAPP, D.M. and GRUMMER, R.R., 1991- Response of dairy cows to fat supplementation during heat stress. *Journal of Dairy Science*, (74), 2573-2579.
- KOHN, R.A., 2007- Use of milk or blood nitrogen to identify feed management inefficiencies and estimate nitrogen excretion by dairy cattle and other animals. *Florida Ruminant Nutrition Symposium, January 30-31*.
- LUJERDEAN, A.; BUNEA, A. and MIRESAN, V., 2008- Seasonal related changes in the major nutrients bovine milk( total protein, lactose, casein, total fat and dry matter). *Lucrari Stiintifice. Seria Zootehnice*, (52), 372-374
- NOZAD, S.; RAMIN, A.G.; MOGHADAM, G.H.; ASRI-REZAEI, S. and BABAPOUR, A., 2011- Diurnal variations in milk urea, protein and lactose concentrations in Holstein dairy cows. *Acta Veterinaria (Beograd)*, (1) 61, 3-11.
- RAJALA-SCHULTZ, P. J.; SAVILLE, W. J. A.; FRAZER, G. S. and WITTUM, T. E., 2001- Association between milk urea nitrogen and fertility in Ohio dairy

cows. *Journal of Dairy Science*, (84), 482-489.

RODRIGUEZ, L.A.; STALLINGS, C.C.; HERBEIN, J.H. and MC GILLIARD, M.L., 1997- Diurnal variation in milk and plasma urea nitrogen in Holstein and Jersey cows response to degradable dietary protein and added fat. *Journal of Dairy Science*, (80), 3368-3376.

SAS, 2002- SAS/STAT User's Guide. Release 6.03 Edition. SAS Institute Inc., Cary, NC., USA.

SCHEPERS, A. J. and MEIJER, R. G., 1998- Evaluation of the utilization of dietary nitrogen by dairy cows based on urea concentration in milk. *Journal of Dairy Science*, (81), 579-584.

TILLARD, E.; HUMBLOT, P.; FAYE, B.; LECOMTE, P.; DOHOO, I. and BOCQUIER, F., 2007- Precalving factors affecting conception risk in Holstein dairy cows in tropical conditions. *Theriogenology*, (68), 567-581.

## Seasonal variations in concentration of milk urea nitrogen in relation to parity, days in milk, daily milk yield and milk components (fat and protein) of Friesian cows

M. AL-MIZIED\*, R. AL-KHARBA\*\* AND Y.A. EL-ARIFI\*\*

\*Department of Animal production, Faculty of Agriculture, Aleppo University, \*\* Department of Animal production, Faculty of Agriculture, Al-Furat University

### Abstract

The present study was carried out at the dairy cows station of Deir Ezzor governorate, belonging to the public establishment of dairy cattle. During the period from January till the end of December 2010. The objective of this study was to assess the seasonal variations in concentration of milk urea nitrogen (MUN) in relation to parity, days in milk, daily milk yield and milk components (fat and protein) of Friesian cows. A total of (40) Friesian cows at different parity were used postpartum from the 1<sup>st</sup> prior to 6<sup>th</sup> months of lactation. These cows comprised two groups. The first group (20) cows were (10) at 1<sup>st</sup> parity and (10) at 3<sup>rd</sup> parity (bred in winter). The second group (20) cows were (10) at 1<sup>st</sup> parity and (10) at 3<sup>rd</sup> parity (bred in summer). The obtained results revealed that the overall averages of milk urea nitrogen concentrations were significantly higher in the second group (18.70 mg/dl) than in the first group (18 mg/dl). Also Cows of the first parity showed a higher significant averages of milk urea nitrogen concentrations (18.61 mg/dl) than that in the third parity (18.09 mg/dl). The stage of lactation had a significant effect on the concentration of milk urea nitrogen in both groups. Whereas the averages of milk urea nitrogen concentrations were high at the first months of lactation and decreased slightly until the 6<sup>th</sup> month. There was a positive relationship ( $P<0.05$ ) between MUN and each of daily milk yield and percentages of milk protein. While there was a negative relationship ( $P<0.05$ ) between MUN and the percentages of milk fat. Based on the results from this study, MUN concentration should be interpreted in association with parity, days in milk, daily milk yield and composition (fat and protein) when MUN was regarded as a management tool to evaluate the efficiency of nitrogen utilization for Friesian cows.

**Key words:** milk urea nitrogen, milk production and components, parity, days in milk, Friesian cows.