

**تقييم كفاءة بعض المبيدات العشبية في مكافحة الأعشاب
عرية الأوراق في حقول القمح القاسي
وتأثيرها على إنتاجية *Triticum durum* (L .)
ونوعية المحصول**

د. أسود المحيمد

قسم وقاية النبات - كلية الزراعة - جامعة الفرات - سوريا

الملخص Abstract

أجريت دراسة حقلية لدراسة تأثير بعض المبيدات العشبية :

- Granstar 75 DF (tribenuron-methyl 75 %)
- Herbazol 36 SL (2,4 – dichloro phenoxy acetic acid 36 %)
- Pallas 45 OD (pyroxsulam 45 %)

وبثلاث تركيزات في مكافحة الأعشاب عريضة الأوراق الحولية وتأثيرها على إنتاجية ونوعية القمح .

أظهرت النتائج المتحصل عليها أن أفضل تركيز للمبيدات : 12.5 غ/هـ ، 2 ل/هـ ، 500 سم³/هـ كانت النسبة المئوية للموت : 100 ، 100 ، 100 ، 100 % وأعطي أعلى وزن للـ 1000 حبة : 51.05 غ ، 51.75 غ ، 50.18 وأعلى إنتاجية : 4346 ، 4472 ، 4584 كغ/هـ وأعلى نسبة مئوية للبروتين : 14.32 ، 14.59 ، 14.89 % ونسبة مئوية للنشاء : 70,80 ، 71,18 ، 48,70 % على التوالي.

الكلمات المفتاحية: مبيدات الأعشاب ، الأعشاب عريضة الأوراق ، القمح القاسي ، إنتاجية ، نوعية . *Triticum durum* (L.)

المقدمة :

يحتل محصول القمح المرتبة الأولى من حيث الأهمية في الجمهورية العربية السورية حيث يشكل 20% تقريباً من مجمل الأراضي القابلة للزراعة، ويختلف إنتاج محصول القمح في سوريا من سنة إلى أخرى تبعاً للظروف المناخية وعمليات الخدمة والأساليب المستخدمة في الزراعة، ويشكل القمح في سوريا قرابة 50% من محاصيل الحبوب الأساسية المزروعة في المنطقة(Belaid,2000) ، وقد وصل إجمالي المساحة المزروعة بالقمح إلى 1.49 مليون هكتار وبلغ الإنتاج 2.14 مليون طن بإنتاجية 1440 كغ/هكتار (المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية، 2008) ، بينما كانت المساحة المزروعة 1.44 مليون هكتار وبلغ الإنتاج 3.701 مليون طن والإنتاجية 2575 كغ / هكتار (المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية، 2009)

وبلغت المساحة المزروعة قمحاً في محافظة دير الزور 78 ألف هكتار (معظمها سقي) أعطت غلة حوالي 4000 كغ/هكتار، هذا ويشغل القمح الطري ثلثي المساحة المزروعة (المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية،2003) . بينما ارتفعت المساحة المزروعة قمحاً في دير الزور إلى 83834 هكتار في عام 2006 (المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية) .

الدراسة المرجعية :

تعتبر الأعشاب رفيعة وعريبة الأوراق من العوامل التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة وخاصة الحبوب حيث تعتبر الأعشاب أهم منافس للقمح خلال فترة تطوره حيث تؤدي إلى نقص في الغلة الحبية (Cheema and Farooq,2007) وتؤدي الأعشاب الضارة إلى قلة الإنتاج الزراعي حيث يصل الفقد في الغلة الحبية إلى 20-30 % (Abbas,2006) ويكون هذا الفقد والخسائر ناجماً عن المنافسة بين العشب والمحصول على العناصر الأساسية المكان والضوء والآزوت والماء (Reddy,2000)، أما في المناطق المروية يتم التنافس على الغذاء في الحنطة 20 كغ نيتروجين في التربة يأخذ العشب حوالي 12 كغ والباقي للمحصول

يتم التنافس بين القمح والأعشاب سواء عريضة أو رفيعة الأوراق وهذا التنافس يؤدي إلى تدني الإنتاج نظراً لقدرة العشب الضار على منافسة القمح في الأسابيع الأولى على الغذاء والماء كون نباتات القمح حساسة في هذه المرحلة مما يؤدي إلى تناقص الغلة (Zimdahl,1980)، ويجب مكافحة الأعشاب في المراحل المبكرة لنموها Avena (Van and Heemst,1985) ، *Medicago denticulata* ، *Phalaris minor*، *fatua oxycantha* ، *Convolvulus arvensis* ، *Chenopodium album*، هو الأكثر منافسة في المحاصيل الزراعية (Avena fatua Carthamus وبعد (Khan et al . 2002). في جميع أنحاء البلاد.

نفذت تجربة في باكستان حيث تم استخدام 5مستويات من بذار الشوفان 0،10،20،30،40،50 غ/م² وكانت إنتاجية القمح بغياب الأعشاب 262 كغ/هكتار وكانت أقل إنتاجية بوجود 50 عشبة من الشوفان/م² 150 كغ/هكتار (Gul and Haroon,2007)

إن الأعشاب رفيعة الأوراق كانت أكثر تأثيراً في قدرتها التنافسية حيث خفض محصول الحبوب ومكوناته مقارنة بالقدرة التنافسية للأعشاب عريضة الأوراق(عبد الحميد ،2006)

استخدام المبيدات الكيميائية يخفض عدد الأعشاب ويؤدي إلى زيادة الغلة في محصول القمح ، فاستخدام مبيد الأعشاب Topik أدى إلى زيادة الغلة الحبية 39.49% حيث كان الإنتاج 3178.56 كغ/ه مقارنة بالشاهد 2278.56 كغ/ه at (Jarwar el.,2005)

وكذلك وجد Thorn عام 1992 من خلال تجربته التي أجراها أن استخدم مبيدات الأعشاب عريضة الأوراق ورفيعة الأوراق أدى إلى الحصول على إنتاج أكبر 2.91 طن/هكتار مقارنة مع باقي المعاملات بالإضافة لذلك أدى إلى ارتفاع % للبروتين في الحبوب 13.8% في حين انخفض البروتين الى 12.1% والانتاجية 1.62 كغ/ه في الشاهد الغير مكافح كيميائياً

استخدام basamid بمعدل 192 كغ/ه لمكافحة الأعشاب المرافقة للقمح حد من الوزن الجاف للأعشاب 84.6% بالمقارنة مع الأعشاب غير المعاملة ورافق انخفاض نمو الأعشاب زيادة نمو القمح ومكونات المحصول والغلة فكان وزن الـ 1000 حبة 41.24 غ في حين كان وزن الـ 1000 في نباتات القمح في الشاهد غير المعشب 30.7 غ (Faida et al., 2010)

أهداف البحث:

- 1- دراسة تأثير كل معاملة مستخدمة على بعض الصفات النوعية وإنتاج القمح.
- 2- معرفة المعاملة الأفضل لخفض تعداد الأعشاب المتواجدة في القمح.

القراءات المدروسة:

- 1- متوسط العدد للأعشاب عريضة ورفيعة الأوراق الحولية والم العمرة كلا على حدة وكذلك الإجمالي في المتر المربع وذلك بعد 30 يوماً من الزراعة وعند الحصاد
- 2- تأثير هذه المعاملات على عدد الأفرع (الإشطاء المنتج) والسنابل في المتر المربع: يتم اختيار 10 نباتات بشكل عشوائي من كل قطعة تجريبية ولجميع المكررات ويتم عد الإشطاء المنتجة من كل نبات وبعد ذلك تم حساب متوسط إشطاء الـ 10 نباتات لكل معاملة وكل مكرر
- 3- طول نبات القمح /سم: يتم اختيار 10 نباتات بشكل عشوائي من كل قطعة تجريبية لكل من صنف ولجميع المكررات ويتم قياس ارتفاع السوق الرئيسية/سم عند النضج من سطح الأرض إلى قمة السنبلة دون قياس السفا وبعد ذلك تم حساب متوسط طول النبات الـ 10 نباتات المختارة

4- الإنتاجية كغ/ه .

5- وزن الألف حبة.

6- % للبروتين

مواد البحث وطرائقه:

مكان تنفيذ البحث :

قرية البوليل والتي تقع على مسافة 20 كم شرقي دير الزور على خط طول 35.22 شرقاً وخط عرض 40.11 شمالاً وعلى ارتفاع 203 م عن سطح البحر

1- صنف القمح المستخدم في التجربة

بحوث 5 : صنف قاسي يتميز بأنه عالي الإنتاج وبأكوري النضج أعتمد هذا الصنف عام 1987 للزراعة المروية في مناطق دير الزور والرقة وعادة" يذكر في النضج عن باقي أصناف القمح القاسي بـ 7 أيام ، يصل طوله إلى 87 سم ، السنابل عريضة ذات زغب على القنابع لون السفا أسود مفترش ، لون الحبوب عسلية كبيرة الحجم ، متوسط نسبة البروتين فيه 13.2 %. عدد الأيام من الزراعة حتى الإسبال 120 يوماً، عدد الأيام من الانبات حتى النضج التام 161 يوماً، وتصل الإنتاجية في ظروف الزراعة المروية إلى 7.5 طن/hec (ايكاردا ، 2003) .

-المبيدات المستخدمة:

مبيد بيكتو 240: (توبيك) Pikto240EC

المادة	الفعالة	Clodinafop-propargyl 240 /g/l+
		Clioquintocetmexl/60/g/l

مبيد أعشاب اختياري على هيئة مستحلب يستخدم بعد الإنبات لمكافحة الأعشاب رفيعة الأوراق في حقول القمح فقط ، يستخدم من مرحلة 3 أوراق حتى طور الإشباء بمعدل 125-180 سم/3هـ ، يمتص عن طريق الأوراق والأفرع النباتية وينتقل بسرعة إلى مناطق النمو ليستقر فيها ويترافق في الأنسجة الميرستيمية ، وكذلك يمتص أيضاً عن طريق الجذور ولكن بشكل أقل نظراً لتفكيك المبيد السريع في التربة، ويسبب توقف نمو الأعشاب خلال 48 ساعة من عملية الرش بحيث يلاحظ أعراض التأثير وظهور جفاف العشب خلال 1- 3 أسابيع حسب الظروف المناخية وطبيعة نمو العشب المعامل.

مبيد الجرانستار :

المادة الفعالة تريبينورون ميثيل ويستخدم بمعدل 12.5 غ/hec بعد الإنبات وعند شكل الأوراق الأولى في محصول القمح .

طريقة العمل :

تصمم التجربة بطريقة القطاعات العشوائية الكاملة RCBD بحيث يقسم الحقل إلى قطع تجريبية مساحة القطعة التجريبية الواحدة 12 م²(طول القطعة التجريبية 4 م وعرضها 3 م) حيث تزرع بذار القمح ، والمعاملات (مبيد أعشاب رفيعة - مبيد أعشاب عريضة - مبيد أعشاب رفيعة وعربيضة) وتتضمن التجربة شاهد 1

معشب يدوى - شاهد 2 شاهد غير معشب

بحيث تكرر كل معاملة ثلاثة مرات ، ويتم تثبيت إطار خشبي في كل قطعة تجريبية مساحتها 1م² حتى نهاية التجربة حسب طريقة تثبيت الإطار الخشبي (Quadrat wooden frame Method)

(Golen kova et al ,1986) . تعد الأعشاب الرفيعة والعريضة الأوراق الموجودة

ضمن المتر المربع لكل قطعة تجريبية .

النتائج المتحصل عليها تحل إحصائيا حسب التصميم المستخدم و المقارنة بين المتوسطات بطريقة اختبار أقل فرق معنوي L.S.D عند مستوى احتمال 5 % .

النتائج والمناقشة:

ان استخدام مبidi جرانستار+توبيك تفوق معنوياً على باقي المعاملات وعلى الشاهد من حيث الإنتاجية وكانت 5322 كغ/ه ولكن لم يكن هناك فرق معنوي بين هذه المعاملة ومعاملة الشاهد المعشب يدوياً حيث كان إنتاج الشاهد المعشب يدوياً 5540 كغ/ه، وكذلك تفوق الشاهد المعشب بوزن الـ1000 حبة وكان 52 غ تلاه استخدام جرانستار+توبيك وكان 51.3 وتفوق معنوياً على استخدام مبidi جرانستار وتوبيك كلاً على حدا وكذلك على الشاهد غير المعشب

جدول (1) يبين تأثير المكافحة الكيميائية على وزن الـ 1000 حبة والإنتاجية في القمح القاسي :

المبيدات المستخدمة	وزن الـ 1000 حبة/غ	الإنتاجية كغ/ه
جرانستار	46	3822
توبيك	49	4312
جرانستار + توبيك	51.3	5322
شاهد غير معشب	45.4	2425
شاهد معشب يدوى	52	5540
CV%	16	6.89
% 5 عند L.S.D	0.75	559.07

تتوقع استخدام مبيدي جرانستار+توبيك و الشاهد المعشب معنوياً على باقي المعاملات من حيث عدد الاشطاءات المنتجة ولم يكن هناك فرق معنوي بين استخدام مبيدي جرانستار+توبيك و الشاهد المعشب يدوياً وكان عدد الاشطاءات 5.3 و 5.6 على التوالي ، كذلك لم يكن هناك فرق معنوي بين استخدام مبيدي جرانستار+توبيك و الشاهد المعشب يدوياً من حيث طول النبات وكان طول النبات 85 سم.

جدول (2) يبين تأثير المكافحة الكيميائية على عدد الاشطاءات المنتجة و طول النبات في القمح القاسي

المبيدات المستخدمة	عدد الاشطاءات المنتجة	طول النبات/ سم
جرانستار	4	79
توبيك	4.8	82
جرانستار + توبيك	5.3	85
شاهد غير معشب	3.3	77
شاهد معشب يدوى	5.6	85
CV%	3.94	1.66
% 5 عند L.S.D	0.34	2.56

تفوق استخدام مبidi جرانستار + توبيك و الشاهد المعشب معنوياً على باقي المعاملات حيث اعطى نسبة بروتين عالية 13.7 ، 13.9 % على التوالي في حين انخفض إلى 12.1 % في الشاهد غير المعشب .

جدول (3) يبين تأثير المكافحة الكيميائية على % للبروتين في القمح القاسي

المبيدات المستخدمة	% للبروتين
جرانستار	12.1
توبيك	13
جرانستار + توبيك	13.7
شاهد غير معشب	12.1
شاهد معشب يدوي	13.9
CV%	1.36
% 5 عند L.S.D	0.33

انخفض عدد الأعشاب إلى 14 عشبة /م² في حال استخدام مبيدي جرانستار + توبيك وتفوق معنوياً على باقي المعاملات حيث زاد عدد الأعشاب في الشاهد غير المعشب 223 عشبة /م² ، حيث انتشرت الأعشاب التالية في الحقل فلاريس - شوفان بري - لوليوم (رفيعة) مدادة - رجل الوزة - عرف الديك - نفل (عرضة)

جدول (4) يبين تأثير المكافحة الكيميائية على عدد الأعشاب في القمح القاسي:

المجموع	عدد الأعشاب / بعد الرش		عدد الأعشاب / قبل الرش		المبيدات المستخدمة
	عربيضة	رفيعة	عربيضة	رفيعة	
120	113	7	108	56	جرانستار
87	15	73	150	70	توبيك
14	8	6	98	69	جرانستار + توبيك
223	144	79	140	77	شاهد غير معشب
0	0	0	88	90	شاهد معشب يدوى
4.93					CV%
8.25					% 5 عند L.S.D

الاستنتاجات:

- 1- حققت المبيدات المستخدمة توبيك وجرانستار معاً فعالية ممتازة في خفض عدد الأعشاب الرفيعة والعربيضة وزيادة في إنتاجية القمح 5322 كغ/ه.
- 2- حققت المبيدات المستخدمة توبيك وجرانستار معاً زيادة في النسبة المئوية للبروتين في القمح مساوية تقريباً للشاهد المعشب يدوياً 13.9-13.7 على التوالي.

الوصيّات:

نوصي باستخدام مبيد التوبيك والجرانستار معاً في مكافحة الأعشاب العربيضة والرفيعة في المراحل الأولى لنمو محصول القمح لما لها من تأثير على خفض عدد الأعشاب وزيادة إنتاجية القمح

المراجع العربية :

- 1- المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية .2003- قسم الإحصاء ، مديرية الإحصاء والتخطيط، وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي، الجمهورية العربية السورية.
- 2- المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية .2006- قسم الإحصاء ، مديرية الإحصاء والتخطيط، وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي، الجمهورية العربية السورية.
- 3- المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية .2008- قسم الإحصاء ، مديرية الإحصاء والتخطيط، وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي، الجمهورية العربية السورية.
- 4- المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية .2009- قسم الإحصاء ، مديرية الإحصاء والتخطيط، وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي، الجمهورية العربية السورية.
- 5- عبد الحميد مسعد محمود- 2006 . تأثير معدلات التقاوى والقدرة التنافسية للحشائش ضيقة وعريفة الأوراق على محصول القمح ومكوناتها لمعامل المركزي لبحوث الحشائش - ش الجامعة - مركز البحوث الزراعية - الجيزة
- 6- مجلة أضواء على أبحاث إيكاراد .2003- المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة .

المراجع الأجنبية:

- 1-Abbas MA.,2006 –General agriculture .Field crop production and management 4thed.publishers Emp0rium ,Ahata Shahdarian,UrdBazar.Lahore.pakistan. 174p.
- 2-Belaid A ., 2000-Durum wheat in wana,production,trade, and gains from technological change.In option mediterraneennes, amelloration du bledur dans la region mediterraneenne:Nouveaux defies.EdsC.royo,M.M. nachit,N.DI Fanzo,J.L.Araus.(CIHEAM;centre Udi-IRTA,cimmyt,icarda),35-49p.
- 3-GheemaZA.,FarooqM.,2007-Agriculture in Pakistan. Agriculture in Pakistan:problems of small farmers and their solutions.23p.Allied Book Center,UrdBazar,Lahore, Pakistan.
- 4-Faida A. Sharara Kowthar G. El- Rokiek Salwa S. Gaweesh.,2010- Effect of soil fumigation Growth Development Yield

**Efficiency evaluation of some herbicides for controlling
broadleaf weeds in durum wheat (*Triticum durum* L.)
fields and their effect on quality and productivity of crop.**

Dr. Aswad AL – Mhemid

Crop protection Dep . Faculty Agriculture University of AL-Furat – Syria

Abstract

A Field study was carried out to study the effect of some herbicides : Granstar 75 DF (tribenuron-methyl 75 %) , Herbazol 36 SL(2,4 – dichlorophenoxy acetic acid 36 %) , Pallas 45 OD (pyroxsulam 45 %) in three concentrations for controlling annual broadleaf weeds and their effect on quality and productivity of crop .

Results showed superior concentration for herbicides : 12.5 G/ h , 2 L/h , 500 cm/h , mortality percentages were 100 , 100 , 100 % a give high for 1000 grains weight : 51.05 , 51.75 , 50.18 G a high yield 4584 , 4472 , 4346 kg/h , a high percentages for protein was : 14.59 , 14.89 , 14.32 % and percentage for starch was : 70.80 , 71.18 , 70.48 % respectively.

Key Words : Herbicides , broadleaf weeds , durum wheat (*Triticum durum* L .) , productivity , quality .