

معامل الحساسية للجفاف ومعامل ثباتية الإنتاج لمجموعة من أصناف القمح القاسي المزروعة في سوريا

مؤيد المسلماني^١ وعبد الرزاق سعود^٢ وفراس العبد الله^٣ وفؤاد الحريري^٤ ومهران
الحسان^٥ ومحمد عادل عمار^٦ وأسامه زهير قنبر^٧ وهند أبو السل^٨

^١: دائرة البيولوجيا الجزيئية، قسم النباتات الحيوية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دواما،
 دمشق، سوريا، البريد الإلكتروني: moaedalmeselmani@yahoo.com

^٢: دائرة المحاصيل، محطة بحوث ازرع، ازرع، درعا، سوريا

^٣: دائرة المحاصيل، مركز بحوث جلين، جلين، درعا، سوريا

الملخص

بعد الجفاف أحد أهم الاجهادات البيئية الذي يتسبب سنوياً في انخفاض كبير في إنتاجية القمح في الكثير من دول العالم وبخاصة عند حدوثه في المراحل المتأخرة من حياة النبات. تم إجراء هذه الدراسة على مجموعة من أصناف القمح القاسي المتباينة في درجة تحملها للإجهاد المائي بهدف غربلة هذه الأصناف لمعرفة القدرة الكامنة على الإنتاجية العالية والتثابنة في ظروف الإجهاد المائي، حيث زرعت هذه الأصناف في منطقة الاستقرار الأولى والثانية وتم دراسة مجموعة من المعايير الفيزيولوجية في مراحل النمو المختلفة للنبات إضافة إلى الإنتاج ومكوناته ثم تم حساب معامل الحساسية للجفاف لكل من القراءات الفيزيولوجية والإنتاجية المدروسة وتم حساب معامل ثباتية الإنتاج لكل من مكونات الغلة. أظهرت الدراسة فروق معنوية واضحة بين الأصناف المدروسة في معامل الحساسية للجفاف حيث تم تسجيل أعلى معامل للحساسية للجفاف لمحتوى الكلوروفيل في الصنف أكساد ٦٥ وبحوث ٧ بينما سجل أخفض معامل للحساسية للجفاف لمعامل ثباتية الغشاء ومحتوى الرطوبة النسبي في الصنف حوراني وشام ٥

اما فيما يخص الفلورة الضوئية فاخفض معامل الحساسية للجفاف سجل في الصنف حوراني في مراحل النمو المختلفة.

تم تسجيل اخضاع قيمة لمعامل الحساسية للجفاف للإنتاج ومكوناته في الصنف حوراني وشام^٥ لكل من عدد الحبوب للسبلة والغلة الحبية والكتلة الحيوية الكلية، بينما سجل الصنف حوراني وشام^٥ أعلى معامل ثباتية الإنتاج لكل من عدد الحبوب في السبلة وزن الألف حبة والغلة الحبية والكتلة الحيوية الكلية. لقد أكدت هذه الدراسة على أهمية المؤشرات الفيزيولوجية ومعامل الحساسية للجفاف وثباتية الإنتاج وارتباطها الوثيق بتحمل الجفاف في ظروف الزراعة البعلية، كما بينت أهمية الاعتماد على هذه المؤشرات في اختيار آباء الهجن وفي الانتخاب لتحمل الجفاف كمكمل وداعم لبرامج تربية القمح القاسي في سوريا.

الكلمات المفتاحية: الجفاف، معامل الحساسية للجفاف، معامل ثباتية الإنتاج، المؤشرات الفيزيولوجية، القمح القاسي.

مقدمة:

بعد القمح أحد أهم وأكثر المحاصيل الإستراتيجية انتشاراً في العالم بحكم أهميته الغذائية التي تشكل مصدراً غذائياً لأكثر من ٣٥٪ من سكان العالم، كما يعد الإجهاد المائي وبشكل رئيسي في فترة امتلاء الحبوب أحد أهم أسباب انخفاض إنتاجية القمح في منطقة وسط آسيا والشرق الأوسط (Ganbalani *et al.*, 2010). إن الأساس الفيزيولوجي لتحمل الجفاف غير مفهوم بشكل كامل وإن فهم كيفية استجابة النبات لنقص الماء وقدرته على تحمل هذا الإجهاد يجب أن يؤدي بالضرورة إلى تحسين الإنتاجية وجعلها بالشكل الأمثل في الظروف غير المواتية وهذا ما أكدته (Gholamin and Khayatnezhad, 2010). أظهرت العديد من الدراسات أن الجفاف أدى إلى إحداث تغيرات ملحوظة في الأداء الفيزيولوجي والاستقلابي للكثير من النباتات، وقد تميزت بعض النباتات بأن لها القدرة على

إجراء مجموعة من التعديلات الفيزيولوجية التي تسمح لها بتحمل الإجهاد المائي (Save et al., 1995). ربط عدد من الباحثين تحمل الجفاف بعدد من الاستجابات الفيزيولوجية الهامة التي يبديها النبات مثل محتوى الأوراق من الصبغيات وثباتيتها والمحنوي العالي من الماء النسبي (Almeselmani et al., 2011). وأشار (2009; 2006) إلى أهمية معامل ثباتية الغشاء للتمييز بين الأصناف المقاومة والحساسة، حيث يحدث تسرب للايونات من الخلايا نتيجة التخريب الذي يحدث للغشاء الخلوي والذي يصبح أكثر نفوذية بتأثير الإجهاد المختلف (Moayedi et al., 2010). كما بين (Senaratna and Kersi, 1983) أن تعرض النباتات لاجهادات مائية مختلفة كان له بالغ الأثر على الإنتاجية. اقترح العالمان (Fischer and Maure, 1978) استخدام مصطلح معامل الحساسية للجفاف من أجل قياس ثباتية الإنتاج والتي تقوم بقياس الإنتاج الكامن والفعلي في الظروف البيئية المختلفة، حيث أن الأداء الجيد نسبياً للأصناف في ظروف الجفاف وفي الظروف المتأللة يعد نقطة بداية عامة للتعرف على الأصناف المناسبة من أجل زراعتها في الظروف البعلية التي من الصعب التنبؤ بكمية الأمطار التي تهطل فيها (Mohammadi et al., 2010).

هدف البحث : يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الإجهاد المائي - المفروض طبيعياً من خلال الزراعة البعلية في كل من منطقة الاستقرار الأولى والثانية- في معامل الحساسية للجفاف لمجموعة من الصفات الفيزيولوجية الهامة ودراسة أثر هذا الإجهاد في معامل ثباتية الإنتاج لمجموعة من أصناف القمح القاسي وتحديد مدى أهمية هذه الصفات في تحسين إنتاجية القمح القاسي في الظروف البعلية.

المواد وطرائق البحث:

١- ظروف إجراء التجربة: استخدمت الأصناف التالية من القمح القاسي وهي: شام ٢، شام ٥ وحوراني وهي أصناف يوصى بزراعتها في منطقة الاستقرار الثانية

(متحملة للجفاف وقلة الامطار المطرية) و اكساد ٦٥، بحوث ٧ وبحوث ١١ وهي أصناف يوصى بزراعتها في منطقة الاستقرار الأولى (حساسة للجفاف وقلة الامطار المطرية). تم الحصول على بذار هذه الأصناف من إدارة بحوث المحاصيل - الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتمت الزراعة بعلا في منطقة الاستقرار الأولى (محطة بحوث جلين حيث معدل هطول الأمطار السنوية ٤٠٠مم) وفي منطقة الاستقرار الثانية (محطة بحوث ازرع حيث معدل هطول الأمطار السنوية ٢٩١مم). زرعت النباتات في موسم ٢٠١٠-٢٠٠٩ بمعدل ٣٠٠ حبة/م٢ وفي ثلاثة مكررات وأثناء عملية الزراعة والعناية بالمحصول تمت مراعاة كافة الإرشادات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. جمعت البيانات المناخية (الحرارة وكمية الأمطار) من قبل محطة الأرصاد الجوية التابعة لكل محطة قيد الدراسة وأخذت القراءات الفيزيولوجية: محتوى الكلوروفيل، معامل ثباتية الغشاء، محتوى الرطوبة النسبي والفلورة الضوئية في المرحلة الخضرية، الإزهار و فترة امتلاء الحبوب، وتم الحصاد في نهاية الموسم وحسب كل من معامل الحساسية للجفاف ومعامل ثباتية الإنتاج.

٢- القراءات الفيزيولوجية المدروسة:

١-١- تقدير محتوى الكلوروفيل: من أجل تحديد محتوى الأوراق من الكلوروفيل تم اعتماد الطريقة المقترحة من قبل (Hiscox and Israelstam, 1979) بوضع ٥٥مغ عينة ورقية في أنبوب اختبار يحتوي ١٠مم من مادة dimethyl sulphoxide ووضعها في الفرن على درجة حرارة ٦٥ درجة مئوية مدة ٤ ساعات ثم اخذ قراءة الامتصاص للمحلول الصافي الناتج على أطوال موجات ٦٦٣ و ٦٤٥ نانومتر (Arnon, 1949).

١-٢- تقدير معامل ثباتية الغشاء: قدر معامل ثباتية الغشاء باستخدام جهاز فراغ الناقلية وحسب الطريقة المقترحة من قبل العالم (Deshmukh *et al.*, 1991).

تؤخذ ١٠٠ أمعن عينة ورقية، قطعت بشكل متوازي ووضعت في أنبوب اختبار يحتوي ماء شائي التقطير. قسمت العينة إلى مجموعتين حيث وضعت المجموعة الأولى ت ١ في حمام مائي على درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية مدة ٣٠ دقيقة بينما وضعت المجموعة الثانية ت ٢ على درجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية مدة ١٥ دقيقة ثم أخذت القراءات لكلا المجموعتين ت ١ و ت ٢ بعد التبريد وحسب معامل ثباتية الغشاء باستخدام المعادلة التالية:

$$\text{معامل ثباتية الغشاء} = \frac{1}{100} \times \left[\left(\frac{T_1}{T_2} \right) - 1 \right]$$

٣-٢- تقدير محتوى الماء النسبي: لحساب محتوى الماء النسبي تم إتباع طريقة العالمان (Barrs and Weatherley, 1962) حيث تم اخذ ١٠٠ أمعن عينة ورقية ووضعت في ماء شائي التقطير في أطباق بتري مدة ساعتين وتم اخذ وزن الإشبع وأخذ الوزن الجاف بعد إبقاء العينات على درجة حرارة ٦٥ درجة مئوية مدة ٢٤ ساعة وتم حساب محتوى الرطوبة النسبي باستخدام المعادلة التالية:

$$\text{محتوى الماء النسبي (\%)} = \frac{\text{وزن الإشبع - وزن الجاف}}{\text{وزن الإشبع + وزن الجاف}} \times 100$$

٣-٣- قياس الفلورة الضوئية: تم قياس الفلورة الضوئية باستخدام جهاز Handsatech وتمت عملية القياس حسب توصيات العالم (Strasser et al., 1995). حيث تمت تغطية الأوراق المراد اخذ القراءة منها باستخدام ملقط خاصة لمدة ٣٠ دقيقة قبل اخذ القراءة وأخذت القراءة من تسعة نباتات في كل صنف ثم اخذ المتوسط.

٣- الإنتاج ومكوناته: عند اكتمال النضج تمت عملية حصاد نباتات القمح من مٌ كل صنف في ثلاثة مكررات وتم تسجيل : عدد السبابيل /م٢، عدد الجبوب في الستبيلة، وزن الألف حبة، الغلة الحبية والكتلة الحيوية الكلية. وتم حساب معامل

الحساسية للجفاف لكل من القراءات الفيزيولوجية المدروسة باستخدام المعادلة المقترنة من قبل (Fischer and Maurer, 1978)

$$\text{معامل الحساسية للجفاف} = \frac{1 - (\text{القيمة المنسوبة في منطقة الاستقرار الثانية}/\text{القيمة المنسوبة في منطقة الاستقرار الأولى})}{1 - (\text{المتوسط المنسوب في منطقة الاستقرار الثانية}/\text{المتوسط المنسوب في منطقة الاستقرار الأولى})}$$

كما تم حساب معامل ثباتية الإنتاج باستخدام المعادلة المقترنة من قبل (Bouslama and Schapaugh, 1984)

$$\text{معامل ثباتية الإنتاج} = \frac{\text{الانتاجية في منطقة الاستقرار الثانية}}{\text{الانتاجية في منطقة الاستقرار الأولى}} \times 100$$

تم تحليل النتائج إحصائيا وقورنت البيانات وحسبت المتوسطات بعد إجراء تحليل التباين ANOVA باستخدام برنامج CoStat 6.311 وباستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وتم حساب الخطأ المعياري وفسرت النتائج تبعاً لذلك.

النتائج والمناقشة:

يتعرض محصول القمح المزروع بعلا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط للكثير من الاجهادات والتي من أهمها الجفاف (Edmedes *et al.*, 1995) الذي يؤثر سلباً في نمو وإنتاجية القمح والمهدد الأكبر للأمن الغذائي وثباتية الإنتاج الزراعي، إذ يزرع ما يزيد عن 60 مليون هكتار بعلا في الدول النامية (Rajaram *et al.*, 1995). القراءات المطرية بينت تعرض النباتات في كلاً المنطقتين لاجهاد الجفاف وبشكل خاص في منطقة الاستقرار الثانية وفي المراحل المتقدمة من حياة النبات حيث وصلت كمية الأمطار الهاطلة في منطقة الاستقرار الثانية لثناء موسم النمو إلى 299 سم أي أقل من منطقة الاستقرار الأولى بحوالي 28٪، والتي تلت 499 سم وهذا ما يوضحه الشكل رقم 1.

أظهرت الدراسة وجود فروقاً معنوية في معامل الحساسية للجفاف لكل من محتوى الكلوروفيل، معامل ثباتية الغشاء، محتوى الرطوبة النسبية والفلورة الضوئية في مراحل النمو المختلفة بين الأصناف المدروسة، حيث تراوحت قيم معامل الحساسية للجفاف لمحتوى الكلوروفيل الكلي في المرحلة الخضرية من ٥٧٪ في الصنف حوراني إلى ٣٧٪ في الصنف أكساد ٦٥، بينما تراوحت من ٦٠٪ في الصنف شام ٥ إلى ٢٣٪ في الصنف بحوث ٧ لمعامل ثباتية الغشاء، أما معامل الحساسية للجفاف لمحتوى الرطوبة النسبية فقد سجل أخفض قيمة في الصنف حوراني وشام ٥ وهي ٤٣٪، و ٤٠٪ على التوالي، بينما سجلت أعلى قيمة لمعامل الحساسية للجفاف للفلورة الضوئية في الصنف أكساد ٦٥ وبحوث ٧ وهي ٥٨٪ أو ٢٦٪ على التوالي كما هو مبين في الشكل رقم ٢. في مرحلة الإزهار تم تسجيل فروق معنوية بين الأصناف وقد سجل أخفض معامل للحساسية للجفاف في الصنف حوراني بينما أعلى قيمة لمعامل للحساسية للجفاف سجل في الصنف أكساد ٦٥ والصنف بحوث ٧ وهي: ٤٦٪، ٦٥٪، ٩٧٪، ١٤٪، ٢١٪، ٤٥٪ - ٢٢٪. لكل من محتوى الكلوروفيل الكلي، معامل ثباتية الغشاء، محتوى الرطوبة النسبية والفلورة الضوئية الشكل رقم ٣ يوضح ذلك. أما في مرحلة امتلاء الحبوب فقد سجل أعلى قيمة لمعامل الحساسية للجفاف في الصنف أكساد ٦٥ والصنف بحوث ٧، أما أخفض قراءة فقد سجلت في الصنف حوراني وهي: ٥٩٪، ٥٨٪، ٥٠٪، ٧٢٪ للقراءات السابقة الشكل رقم ٤ يبين ذلك.

اما فيما يتعلق بالإنتاج ومكوناته فان أعلى معامل للحساسية للجفاف لعدد البنور في السنبلة سجل في الصنف أكماد ٦٥ والصنف بحوث ٧ وهي ٤٩، ٠ و ٣٥، ٠ وسجل أخفض معامل للحساسية للجفاف ٠٠٥ في الصنف حوراني، أعلى معامل للحساسية للجفاف سجل لوزن الالاف حبة مقارنة بمكونات الإنتاج الأخرى، حيث كانت قيم هذا المعامل أعلى من ١ في جميع الأصناف مما يدل على الحساسية المفرطة لهذه الصفة في ظروف الإجهاد المائي، وقد أظهر الصنف بحوث ١١ أعلى

قيمة لمعامل الحساسية للجفاف لصفة وزن الألف حبة وهي ٤٢،٦ وأخفض قيمة لمعامل الحساسية سجل في الصنف دوما ١ وهي ٢،٧٦، اما أخفض قيمة لعدد السنايل سجل في الصنف حوراني وهي ١٩،٠ بينما أعلى معامل سجل في الصنف أكساد ٦٥ وهي ٦٣،٠.. أعلى قيمة للغلة الحبية سجل في الصنف بحوث ٧ وهي ١،١ بينما أخفض قيمة للغلة الحبية سجل في الصنف شام ٥ وهي ٥٣،٠ فيما يخص الكتلة الحيوية الكلية فان أخفض قيمة لمعامل الحساسية للجفاف لكتلة الحيوية الكلية ١٢،٠ في الصنف حوراني والقيمة الأعلى سجلت في الصنف أكساد ٦٥ وهي ٤٤،٠ كما هو واضح في الشكل رقم ٥.


اما فيما يخص معامل ثباتية الإنتاج فان أعلى قيمة سجلت لعدد البنور في السنبلة في الصنف حوراني والصنف شام ٥ وهي ٦٩،٤ و ٥٢،٣ وأخفض قيمة سجلت في الصنف أكساد ٦٥ وهي ٣٧،٨. فيما يخص وزن الألف حبة فان أعلى قيمة لمعامل ثباتية الإنتاج سجل في الصنف دوما ١ والصنف حوراني وهي ٣٩،٩ و ٣٩،١ اما أخفض قيمة فقد سجلت في الصنف أكساد ٦٥ وهي ٣٠،٦. أعلى قيمة لمعامل ثباتية الإنتاج لعدد السنايل سجلت في الصنف شام ٥ والصنف شام ٣ وهي ٩٥،١ و ٩٢،٤ وأخفض قيمة سجلت في الصنف أكساد ٦٥ وهي ٨٣،٤. فيما يخص الغلة الحبية فان أعلى قيمة لمعامل ثباتية الإنتاج سجل في الصنف حوراني وهي ٥٨،٩ وأخفض قيمة سجلت في الصنف أكساد ٦٥ والصنف بحوث ٧ وهي ٣٦،٩ و ٣٧،٥. اما بالنسبة لكتلة الحيوية الكلية فان أعلى معامل لثباتية الإنتاج سجل في الصنف دوما ١ وهي ٢٨،٤ اما أخفض قيمة فقد سجلت في الصنف بحوث ١١ وأكساد ٦٥ وهي ٢٣،٣ و ٢١،٢ كما هو مبين في الشكل رقم ٦.

بشكل عام أظهرت نتائج هذه الدراسة ان معامل الحساسية للجفاف للأصناف المتحملة كان أخفض منه للأصناف الحساسة لكل من القراءات الفيزيولوجية المدروسة في مراحل النمو المختلفة للنبات، وكانت الفروق عالية المعنوية في جميع القراءات المأخوذة. كما أن معامل الحساسية للجفاف لكل من


مكونات الإنتاج للأصناف الحساسة كان أعلى منه للأصناف المتحملة والفرق كانت معنوية الجدول رقم ١(أ، ب، ج، د) يوضح ذلك. أما فيما يتعلق بمعامل ثباتية الإنتاج لمكونات الإنتاج فقد كانت للأصناف الحساسة أخفض منه للأصناف المتحملة علماً أن الفروق كانت معنوية لعدد الحبوب في السنبلة، الغلة الحبية والكتلة الحيوية الكلية كما هو واضح في الجدول رقم ٢.

إن انتخاب أصناف القمح التي لديها القدرة على تحمل الجفاف وإعطاء غلة حبية جيدة في هذه الظروف شكل تحدياً كبيراً لمربي النبات خلال الـ ٥٠ سنة الماضية (Lopez *et al.*, 2003)، كما أن تطوير صنف قمح عالي الإنتاجية في ظروف الجفاف يعد أحد أهم أهداف برامج التربية في المناطق الجافة وشبه الجافة (Leilah *et al.*, 2005). بينت الدراسات السابقة بأن الأصناف التي تميزت بمعامل عالي لثباتية الإنتاج هي أصناف متحملة للجفاف (Rathore, 2005). وإن القدرة الكامنة على الإنتاج في الظروف المثالية ليس بالضرورة أن ينتج عنه تحسين للإنتاج في ظروف الجفاف، كما إن استخدام معيار ثباتية الإنتاج في ظروف الجفاف بعد وسيلة جيدة لتوصيف أداء الأنماط الوراثية في ظروف الإجهاد المائي (Ahmad *et al.*, 1999) (Pinter *et al.*, 1990). فقد بين (Brucker and Frohberg, 1987) أن معامل الحساسية للجفاف بعد وسيلة جيدة للتعرف على الأنماط الوراثية ذات القدرة العالية في المحافظة على ثبات الإنتاج في ظروف الإجهاد المائي. حيث أن الأنماط الوراثية التي أظهرت قيم منخفضة لمعامل الحساسية للجفاف يمكن اعتبارها بأنها أصناف متحملة للإجهاد المائي بحسب (Clarke *et al.*, 1984) إلى أن معامل الحساسية للجفاف يساعد في قياس ثباتية الإنتاج اعتماداً على التقليل من الانخفاض في الصفة المدروسة في ظروف الإجهاد مقارنة بالظروف المثالية. وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى استخدام معامل الحساسية للجفاف من أجل التعرف على الأنماط الوراثية التي تتميز


بنائية الإنتاج في ظروف الإجهاد المائي (Bansal and Sinha, 1991). وقد أكد كل من (Fischer and Maurer, 1978) على استخدام معامل الحساسية للجفاف الذي يقوم بتوصيف بنائية الإنتاج بين بيئتين. أظهرت هذه الدراسة ارتباط قوي بين معامل الحساسية للجفاف ومعامل بنائية الإنتاج وارتباطهما القوي بالأداء النسبي للنبات في ظروف منطقة الاستقرار الثانية مما يؤكد على أهمية هذه المعايير وضرورة استخدامها في عملية الغربلة والانتخاب من أجل تحمل الجفاف.




الشكل رقم ١ . كمية الأمطار الماطلة في كل من منطقة الاستقرار الأولى والثانية
أثناء موسم الزراعة




الشكل رقم ٢. معامل الحساسية للجفاف لكل من محتوى الكلوروفيل الكلي، معامل ثباتية الغشاء، محتوى الرطوبة النسبية والفلورة الضوئية للأصناف المدرستة في المرحلة الخضراء، LSD at 5%: ١٨، ١١، ١٧، ٢٤، ٢٤، على التوالي.




الشكل رقم ٣. معامل الحساسية للجفاف لكل من محتوى الكلوروفيل الكلي، معامل ثباتية الغشاء، محتوى الرطوبة النسبية والفلورة الخلوية للأصناف المدروسة في مرحلة الإزهار، LSD at 5%: ٢٢، ٢٥، ٣٣، ١٩، ٠٠، ٢٥، ٠٠، على التوالي.



الشكل رقم ٤. معامل الحساسية للجفاف لكل من محتوى الكلورو في الكلي، معامل ثباتية الغشاء، محتوى الرطوبة النسبية والفلورة الضوئية للأصناف المدروسة في فترة امتلاء الحبوب، LSD at 5%: ١٩، ٢٨، ١٢، ٢٠، ٢٠، ١٩، ٢٨، ١٢، ٢٠ على التوالي



الشكل رقم ٥. معامل الحساسية للجفاف لكل من عدد البذور/المتريل، وزن الألف حبة، عدد المسابيل/م٢، الغلة الحبية والكتلة الحبيبة الكلية، LSD at 5%: ١١، ٥٥، ١٠، ١٢، ١٢، ٢٠ على التوالي.



الشكل رقم ٣. معامل ثباتية الإنتاج لكل من عدد البذور/الستبة، وزن الألف حبة، عدد السنابل/ م^2 ، الغلة الحية والكتلة الحيوية الكلية، LSD at 5%: ٤، ٦، ٨، ٤، ٥، ٢، ٦، ٢، ٨، ٢، ٦ على التوالي.

الجدول رقم ١ (أ، ب، ج، د): معامل الحساسية للجفاف في كل من الأصناف المتحملة والحساسية لكل من محتوى الكلوروفيل الكلسي، معامل ثباتية الإنتاج، محتوى الرطوبة النسبية والفلورة الضوئية في المراحل المختلفة من حياة النبات ومعامل الحساسية للجفاف للإنتاج ومكوناته.

المرحلة الخضراء				
الفلورة الضوئية	محتوى الرطوبة النسبية	معامل ثباتية الفحص	محتوى الكلوروفيل الكلسي	الأصناف
٠,٩٠٥	٠,٧٦٦	٠,٨٠٧	٠,٧٢٩	المتحمة للجفاف
١,٠٤٧	١,٤٢٣	١,١٥٦	١,٣٠١	الحسنة للبياض
٠,٧٧	٠,٧٧	٠,٧٣	٠,٧٩	LSD at 5%

(أ)

مرحلة الإزهار				
الفلورة الضوئية	محتوى الرطوبة النسبية	معامل ثباتية الفحص	محتوى الكلوروفيل الكلسي	الأصناف
٠,٦٩٤	٠,٧٥٤	٠,٨١٤	٠,٧٨٦	المتحمة للجفاف
١,٣٧٧	١,٣٧٧	١,١٦٢	١,١٩١	الحسنة للجفاف
٠,٠٣	٠,٧٤	٠,٧٦	٠,٨١	LSD at 5%

(ب)

مرحلة انتلاء الحبوب				
الفلورة الضوئية	محتوى الرطوبة النسبية	معامل ثباتية الفحص	محتوى الكلوروفيل الكلسي	الأصناف
٠,٥٧٣	٠,٨١٩	٠,٧٦٩	٠,٦٨٧	المتحمة للجفاف
١,٠٢٤	١,١٦٨	١,١٨٧	١,٢٦٥	الحسنة للجفاف
٠,١٥	٠,٥٨	٠,٩٦	٠,٣٣	LSD at 5%

(ج)

مكونات الإنتاج					
الكتلة الحيوية الكلية	كتلة قوية	عدد الساقين/cm ²	وزن الألف حبة	عدد الحبوب/السترة	الأصناف
٠,٩٢٢	٠,٦٩٥	٠,٥٦٨	٠,٧٨٨	٠,٣٣٨	المتحمة للجفاف
١,٠٣٣	١,٠٨٨	١,٠٧٨	٠,٣٣٤	١,٠٥٣	الحسنة للبياض
٠,٠٠٢	٠,٠٣٩	٠,١٣	٠,٦٩	٠,٠٣٦	LSD at 5%

(د)

الجدول رقم ٤. معامل ثباتية الإنتاج في كل من الأصناف المتحملة والحساسة لكل من عدد الحبوب/الستمائة، وزن ألف حبة، عدد السنابل/ m^2 ، الغلة الحبية والكتلة الحيوية الكلية.

الأصناف	عدد الحبوب/الستمائة	وزن ألف حبة	عدد السنابل/ m^2	الغلة الحبية	الكتلة الحيوية الكلية
المتحملة للجفاف	٤٥,١٥	٨٧,٥	٣٣,١٦	٣٨,٤	٢٢,٦
الحساسة للجفاف	٥١,١	٩٢,٣	٣٧,١	٤٩,٣	٢٨,٤
LSD at 5%	١,٩٦	٩	٨,٥١	٣,٩	٠,٣٧

المراجع:

- AHMAD R.; Stark J.C.; Tanveer A. and Mustafa T., 1999- Yield potential and stability indices as methods to evaluate spring wheat genotypes under drought. *Agricultural Sciences*. 4, 53-9.
- ALMESELMANI M.; Abdullah F.; Hareri F.; Naaesan M.; Ammar M.A., Kanbar O. Z. and Saud Abd A., 2011- Effect of drought on different physiological characters and yield component in different Syrian durum wheat varieties. *Journal of Agricultural Science*. 3, 127-133.
- ALMESELMANI M.; Deshmukh P.S. and Sairam R.K., 2009- High temperature stress tolerance in wheat genotypes: Role of antioxidant defense enzymes. *Act Agronomica Hungarica*. 57, 1-14.
- ALMESELMANI M.; Deshmukh P.S.; Sairam R.K.; Kushwaha S.R. and Singh T.P., 2006- Protective role of antioxidant enzymes under high temperature stress. *Plant Science*. 171, 382-388.
- ARNON D.I., 1949- Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in *Beta vulgaris*. *Plant Physiology*. 24, 1-15.
- BANSAL K.C. and Sinha S.K., 1991- Assessment of drought resistance in 20 accessions of *Triticum aestivum* and related species. I. Total dry matter and grain yield stability. *Euphytica*. 56, 7-14.
- BARRS H.D. and Weatherley P.E., 1962- Are-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficits in leaves. *Australian Journal of Biological Science*. 24, 519-570.
- BOUSLAMA M.S. and Chapaugh W.T., 1984- Stress tolerance in soybean. Part1: Evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance. *Crop Science*. 24, 933-937.
- BRUCKNER P.L. and Frohberg R.C., 1987- Stress tolerance and adaptation in spring wheat. *Crop Science*. 27, 31-36.

- CLARKE J.M.; Townley-Smith T.F.; Mc Caig T.N. and Green D.G., 1984- **Growth analysis of spring wheat cultivars of varying drought resistance.** *Crop Science.* 24, 537-541.
- DESHMUUKH P.S.; Sairam R.K. and Shukla D.S., 1991- **Measurement of ion leakage as a screening technique for drought resistance in wheat genotypes.** *Indian Journal of Plant Physiology.* 34, 89-91.
- EDMEDES C.O., Chapman S.C., Balanus J. Banziger M. and Lafitte H.R., 1995- **Recent evaluation of progress in selection for drought tolerance in tropical maize.** Proceedings of the 4th eastern and Southern African Regional Maize Conference. Harare, Zimbabwe, Mar.28- Apr.1, 1994, CIMMYT, Mexico, PP: 94-100.
- EHDAIE B.; Waines J.G. and Hall A.E., 1988- **Differential response of landraces improved spring wheat genotypes to stress environments.** *Crop Science.* 28, 838-842.
- FISCHER R.A. and Maurer R., 1978- **Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield response.** *Australian journal of Agricultural Research.* 29, 897-907.
- GANBALANI A.N.; Nouri- Ganbalani G. and Hassanpanah D., 2010- **Comparison of drought tolerance indices of 15 advanced winter and intermediate cold hardy wheat Genotypes in Ardabil, Iran.** *Research Journal of Environmental Science.* 4, 180-186.
- GHOLAMIN R. and Khayatnezhad M., 2010- **Study of some physiological responses of drought stress in hexaploid and tetraploid wheat genotypes in Iran.** *Middle-East Journal of Science Research.* 6, 246-250.
- HISCOX J.D and Israelstom G.F., 1979- **A method for the extraction of chlorophyll from leaf tissue without maceration.** *Canadian Journal of Botany.* 57, 1332-1334.

- LEILAH A.A. and Al Khateeb S.A., 2005- **Statistical analysis of wheat yield under drought conditions.** *Journal of Arid Environment.* 61, 483-496
- LOPEZ C.G.; Banowetz G.M.; Peterson C.J. and Kronstad W.E., 2003- **Dehydrin expression and drought tolerance in seven wheat cultivars.** *Crop Science.* 43, 577-582.
- MOAYEDI A.A.; Boyce A.N. and Barakbah S.S., 2010- **The performance of durum wheat and bread wheat genotypes associated with yield and yield component under different water deficit conditions.** *Agricultural Journal of Botany and Applied Sciences.* 4, 106-113.
- MOHAMMADI R; Armion M.; Kahrizi D. and Amri A., 2010- **Efficiency of screening techniques for evaluating durum wheat genotypes under mild drought conditions.** *International Journal of Plant Production.* 4, 11-24.
- PINTER JR. P. J.; Zipoli G.; Reginato R.J.; Jackson R.D. and Idso S.B., 1990- **Canopy temperature as an indicator of differential water use and yield performance among wheat cultivars.** *Agricultural Water Management.* 18, 35– 48.
- RAJARAM S.H.; Braun J.; Van Ginkel M. and Tigerstedt P.M.A., 1995- **CIMMYT approach to breed for tolerance.** *Euphytica.* 92, 147-153.
- RATHORE P.S., 2005- **Techniques and management of field crop production.** Agribios, India, ISBN: 9788177540543, PP: 526.
- SAVÉ R.; Biel C.; Domingo R.; Ruiz-Sánchez M.C. and Torrecillas A., 1995- **Some physiological and morphological characteristics of citrus plants for drought resistance.** *Plant Science.* 110, 167–172.
- SENARATANA T. and Kersi B.D., 1983- **Characterization of solute efflux from dehydration injured soybean (*Glycine max*, Merr.) seeds.** *Plant Physiology.* 72, 911-914.

STRASSER R.J.; Srivastava A. and Govindjee 1995. **Polyphasic chlorophyll a fluorescence transient in plants and Cyanobacteria.** *Photochemistry and Photobiology*. 61, 32-42.

Drought susceptibility index and yield stability index of some Syrian durum wheat varieties

Moaed Almeselmani¹, Abd Alrzak Saud², Feras Abdullah³, Fouad Harer², Mahran Naaesan³, Mohammad Adel Ammar³ and Osama Zuher Kanbar³ and Hened Abo ALseel³

¹Department of Biotechnology, GCSAR, Douma, Damascus, Syria,
Email: moaedalmeselmani@yahoo.com

²Izra Research station, Daraa Agriculture Research Center, GCSAR, Daraa, Syria

³Daraa Agriculture Research Center, GCSAR, Jellen, Daraa, Syria

Abstract

Drought is a major limiting factor affecting crop production. The negative effect of drought on yield performance has been well documented as a major problem in many developed and developing countries of the world. Drought stress tolerance is seen in almost all plants but its extent varies from species to species and even within species. Tolerance to abiotic stresses is very complex, due to the intricate of interactions between stress factors and various molecular, biochemical and physiological phenomena affecting plant growth and yield. The objectives of this study, therefore, were to screen wheat varieties with high yield potential and stability under water stress conditions.

Six durum wheat varieties viz., Sham3, Sham5, Hourani, Doma1, ACSAD65, Bohouth7 and bohouth11 were used in this study and sown under rainfed conditions in the field in the first and second settlement zones. Number of physiological traits was estimated at different growth stages. Yield and yield components were also measured and drought susceptibility index and yield stability index were calculated for all measured physiological traits and yield components. Highest value for drought susceptibility index for chlorophyll content were recorded in ACSAD65 and Bohouth7, while lowest value were recorded in hourani and sham5 for membrane stability index and relative water content at different stages of plant growth. For yield components lower value for drought susceptibility index were recorded in hourani and sham5 and highest value for yield stability index for yield components were recorded in hourani and sham5. Finally we can conclude that these parameters could explain some of the mechanisms which indicate tolerance to drought and it's clear that a physiological approach would be the best way to develop new varieties.

Key words: drought, Drought susceptibility index, yield stability index, durum wheat